


卷

十一

吉慶堂









濟陰綱目卷之十一

關中 武之望叔卿父輯著 武林 張志聰隱庵父訂正

西陵 汪 淇瞻子箋釋 天都 查 望子周父叅閱

○產後上

○論產後調理法

大全云凡生產畢飲熱童便一盞不得便臥宜閉目少坐須臾上  
牀宜仰臥不宜側臥宜豎膝未可伸足高倚牀頭厚鋪衾褥遮圍  
四壁使無孔隙免致賊風及以醋塗鼻或用醋炭及燒漆器更以  
手從心擗至臍下使惡露不滯如此三日以防血暈血逆不問腹  
痛不痛有病無病以童便和酒半盞溫服五七服酒雖行血亦不  
可多恐引血入四肢且能昏暈宜頻食白粥少許一月之後宜食



至信

皆新產切實  
治法須熟之

產後雖當大  
補亦宜審處

羊肉猪蹄少許。仍慎言語。七情寒暑。梳頭洗足。以百日為度。若氣血素弱者。不計日月。否則患手足腰腿痠痛等證。名曰蓐勞。最難治療。初產時。不可問是男是女。恐因言語而泄氣。或以愛憎而動氣。皆能致病。不可獨宿。恐致虛驚。不可刮舌。恐傷心氣。不可刷牙。恐致血逆。須血氣平復。方可治事。犯時微若秋毫。成病重如山嶽。可不戒哉。陳藏器云。漬苧汁。與產婦服之。將苧蔴與產婦枕之。止血暈。產婦腹痛。以苧安腹上。則止。產婦將息。如法臟腑調和。庶無諸疾。苦須先服黑神散。四物湯。四順理中丸。七寶散。若壯熱頭痛。此乳脉將行。用玉露散。頭目不清。是血暈。用清魂散。粥食不美。是胃氣虛。用四順理中丸。

論產後大補血氣為主

丹溪曰。產後當大補血氣為主。雖有雜證。以未治之。○產後為神虛。



露者無內傷  
外感虛實何  
如庶為合理  
孰輕用淡參  
人所易忽却  
最妙  
法言

此論出骨方  
發揮其血病  
治血以下尚  
有寒者溫之  
熱者清之類  
者行之虛者  
補之血多者  
止之五旬似  
不可少姑識  
之以便採擇

丹溪曰：產後當大補血氣為主。雖有雜證，以未治之。○產後為補虛。用參、朮、黃、著、陳、皮、歸、身、尾、川、芎、炙、甘、草，如發熱輕，則加茯苓、淡滲。之其熱自除。重則加乾薑。○凡產後有病，先固氣血。○產後一切病，多是血虛，皆不可發表。○新產後，不可用苦藥，以其酸寒能伐生發之氣故也。○大抵胎前毋滯，產後毋虛。

○論產後服熱藥之誤

丹溪曰：或問新產之婦，好血已虧，汚血或留，彼黑神散，非要藥乎。答曰：至哉！坤元萬物資生，理之常也。初產之婦，好血未必虧，汚血未必積，臟腑未必寒，何以藥為？飲食起居，勤加調護，何病之有？誠有汚血，體怯而寒，與之數帖，亦自簡便。或有他病，當求病起何因。病在何經，氣病治氣，血病治血，何用拘執此方？例令服餌，設有性急者，形瘦者，本有怒火者，夏月坐蓐者，時在火令，薑、桔皆為禁藥。



○論新產二病○

不可專主氣

仲景云問新產婦人有

二病一者病瘕

一者痢。二者血。三者大便難。又合兩症亡血復汗寒多。



讀此則知症亦有外來不可專主氣血不足而驟用神劑反致不救也

至言

不可服湯謂不可服補氣之劑故羊肉湯亦俟塊散後服

仲景云問新產婦人有三病一者病瘕二者病鬱冒三者大便難何謂也斷曰新產血虛多汗出喜中風故令病瘕亡血復汗寒多故令鬱冒亡津液胃燥故大便難產婦鬱冒即今世所謂血暈也

○產後諸忌

千金云凡產後滿百日乃可會合不爾至死虛羸百疾滋長慎之凡婦人患風氣臍下虛冷莫不出此早行房故也○產後七日內惡血未盡不可服湯候臍下塊散乃進羊肉湯有痛甚切者不在此例候兩三日消息可服澤蘭丸此至滿月凡藥盡為佳不爾虛損不可平復也至極消瘦不可救者服五石澤蘭丸補之服法必七日之外不得早服也○凡婦人因暑月產乳取涼太多得風冷腹中積聚百疾競起迄至於死百方病不能差桃仁前生之出露



後服之。婦人總令無病。每至秋冬須服一二劑。以至年內常將服之佳。

○脉法

不調字并附  
骨不絕字重  
看

脉經云。診婦人生產之後。寸口脉洪疾不調者死。沉微附骨不絕者生。○婦人新生乳子脉沉小滑者生。實大堅弦急者死。

洪數中得胃  
氣者亦生堅

丹溪曰。產前脉細小。產後脉洪大者多死。○又曰。產前脉當洪數。

暈者死亦須  
審原稟脉何

既產而洪數刻故者多主死。此亦大槩言之。今見產後豈無脉洪數而生者。

如乃當知

○胞衣不下

大全云。夫有產兒出。胞衣不落者。世謂之息胞。由產初時用力比產兒出。而體已疲憊。不復能用力。產胞經停之間。而外冷乘之。則血道澹。故胞之不出。須急以方藥救治。不妨害於兒所奈者。胞繫

連兒臍胞不出。自不得以時斷。臍絡必痛。氣血俱見。則產後必危。此蓋五



連見臍胞不出。卽不得以時斷臍。浴洗冷氣。傷兒則成病也。舊法胞衣不出。恐損兒者。依法截臍而已。產處須順四時。方向并避五行禁忌。若有觸犯。多令產婦難產。

郭稽中論曰。胎衣不下者。何答曰。母生子訖。流血入衣中。衣爲血所脹。故不得下。治之稍緩。脹滿腹中。以次上衝心胸。疼痛喘急者。難治。但與奪命丹以逐去衣中之血。血散脹消。胎衣自下。牛膝湯亦效。

薛氏曰。有因惡露入衣。脹而不能出。有因元氣虧損。而不能送出。其惡露流衣中者。腹中脹痛。用奪命丹。或失笑散。以消瘀血。緩則不救。其元氣不能送者。腹中不脹痛。用保生無憂散。以補固元氣。

草麻子小驗

或用草麻子肉一兩。細研成膏。塗母右足心。衣下卽洗去。緩則腸



作嘔者爲  
力出也設  
能出徒傷  
血  
此方最捷

亦出如腸不收仍用此膏塗腦頂則腸自收益母丹亦效  
家人婦胎衣不落胸腹脹痛手不敢近此瘀血爲患用熟酒下失  
笑散一劑惡露胎衣並下

一產婦胎衣不出腹不脹痛手按之痛稍緩此是氣虛而不能送  
出用無憂散而下前證余詢諸穩婆云宜服益母草丸或就以產  
婦頭髮入口作嘔胎衣自出其不出者必死授與前法甚効

一產婦產後面赤五心煩熱敗血入胞胞衣不下有冷汗思但去  
其敗血其衣自下遂用黑豆二合炒透然後燒紅鐵秤錘同豆淬  
酒將豆淋酒化下益母丹二丸胞衣從血而出餘證盡平

奪命丹治胞衣不下益兒之初生惡血流入衣中爲血所脹塞  
故不得下須臾冲上逼心卽死急服此藥



此即法中  
配服有神

黑附子

炮五錢

牡丹皮

一兩

乾漆

炒烟盡二錢五分

右爲細末。用米醋一升。大黃末一兩。同煮成膏。和前藥爲丸。如

桐子大。每服五七丸。溫酒下。

奪命丸。治胞衣不下。並治胎死。

牡丹皮

桃仁

茯苓

赤芍

桂心

各等分

右爲末。蜜丸。彈子大。每一丸醋湯化下。或葱白煎濃湯下。尤妙。

連進兩丸。死胎腐爛立出。

牛膝湯。治胞衣不出。臍腹堅脹急痛。即殺人。服此藥胞即爛下。

死胎亦下。

牛膝

瞿麥

各四兩

當歸尾

通草

各六兩

滑石

八兩

葵子

五兩

一方有桂心二兩。



應量之極妙  
膏桂四錢

緩九法服  
法俱奇妙

右細切以水九升煮取三升分三服

牛膝散 治胞衣不出腹中脹痛急服此藥腐化而下緩則不救

牛膝

川芎

朴硝

蒲黃

各七錢半當歸一兩五錢桂心五錢

右剉每服五錢加生薑三片生地黃一錢水煎服

加桂芎歸湯 有胎衣不下因產時元氣虛薄者以此溫之自下

川芎

當歸各二官桂四錢

右剉一服水煎服

黑龍丹 治難產及胞衣不下血迷血暈不省人事一切危急惡

證垂死者但灌藥得下無不全活

當歸

五靈脂

川芎

良薑

熟地黃

各二兩剉碎人砂鍋

內紙筋鹽泥固濟火煨過

百草霜一兩

硫黃

乳香各二錢

琥珀



花蕊石各一錢

右爲細末醋糊丸如彈子大每用一二丸炭火煨紅投入生薑自然汁浸碎以童便合酒調灌下

花蕊石散治產後敗血不盡血迷血暈胎死腹中胎衣不下至死心頭煖者急用一錢化下卽出其効如神

花蕊石一觔上色硫黃四兩各一觔

右和勻先用紙泥封固瓦礫一箇入二藥仍封固陰乾如急用以火籠內炙乾用炭火煨赤去火次日取出研細每服一錢童便熱酒下

一方胞衣不出

牛膝一兩葵子一合



右劉以水一升者半升去渣分二服。

千金備急丸。治產後惡血衝心胎衣不下腹中血塊。

錦紋大黃一兩爲細末用醪醋半升同煎如膏丸如桐子大溫醋湯下五丸或七丸須臾惡下即愈。

胡氏法。治產後胞衣不下惟有花蘆石散一件最爲要緊若鄉

居藥局遠者倉卒無之今有一妙法產訖胞衣不下稍久則

血流胞中爲血所脹上衝心胸喘急疼痛必致危篤若有此

證其急斷臍帶以少物繫帶必用力牢固繫之然後截斷便

其子血脈不潮入胸中胞衣白當痿縮而下縱淹延數日亦

不害人屢驗。

治胞衣不下雜方。



五靈脂爲細末。溫酒調下二錢。

一方取小麥合小豆煮濃汁。飲之立出。

一方皂角刺燒爲末。溫酒調下一錢。

一方蛇退燒爲細末。酒下二錢。

一方黑豆一合炒熟。入醋一盞煎三五沸。去豆分三服。酒煮亦可。

一方取竈內黃土一斗。研細醋調勻。納于臍中。續煎甘草湯三四

合服之出。

一方墨三寸爲末。酒服。

一方生地黄汁一升。苦酒三合。煖服之。

一方竈突墨三指撮許。以水苦酒調服。立出。

一方雞子一枚。苦酒一合。和飲之。



一。方。生男吞小豆七枚。生女吞十四枚。即出。

一。方。浸葶水。濃煮。飲三碗。立下。

一。方。取產母鞋底炙熟。熨大小腹上。下二七次。

一。方。取初洗兒湯。服下一盞。勿令產母知。

一。方。蘇蘇實一個。取子研細。用酒煮硬。各半盞。相和煎至七分去

滓。溫服。如無實根亦可。

一。方。紅花一兩。酒煮濃汁服。

一。方。以鹿角鎊為屑。研細三分。煮葱白湯調下。

一。方。凡欲產時。必先脫常所着衣。以籠覆胞衣。白下仍易產。

一。方。取夫單衣。蓋井上立出。

○血暈厥逆附



一條鉄用心  
使力過多作  
暈治法大都  
以清心涼血  
補益陰主如  
後保金集方  
用童便或麥  
門冬梅之類  
皆可而薛氏  
用補中益氣  
者為勞力也  
若用心則時  
妙安神丸亦  
妙或疑內有  
黃連于產后  
不宜則存乎  
用者

醋解法收其

大全云。產後血暈者。由敗血流入肝經。以致眼黑頭旋。不能起坐。甚至昏悶。不省人事。謂之血暈。以陳酒調黑神散。最佳。若作暗風中風治之。誤矣。血熱乘虛。逆上。湊心。以致昏迷。不省氣閉。欲絕者。服重便最妙。然其由有三。有用心使力過多。而暈者。有下血過多。而暈者。有下血少。而暈者。其暈雖同。治之則異。當審詳之。下血多而暈者。昏而煩亂。而已當以補血清心藥。下血少而暈者。乃惡露不下。上搶于心。心下滿急。神昏口噤。絕不知人。當以破血行血藥。占法云。產婦分娩訖。預將秤錘。或黃石子。硬炭燒令通赤。置器中。急于牀上。以醋沃之。得醋氣。可除血暈。產後一月內。時作為妙。崔氏云。凡暈者。皆是虛熱。血氣奔進腹中。空虛所致。欲分娩者。第一須先取醪醋。以塗口鼻。仍置醋于傍。使聞其氣。兼細細飲之。此為



神水解法清  
其熱瘋乾涸  
者散其血迷  
于上也俱妙

卷一

上法如覺暈卽以醋嚥面甦來卽飲醋仍少與解之一云仍少與水解之

法燒乾漆令烟濃熏產母面卽是如無乾漆取舊漆器火燒烟熏亦妙

郭稽中曰產後血暈者何答曰產後血氣暴虛未得安靜血隨氣

上迷亂心神故眼前生花極甚令人悶絕不知人口噤神昏氣

冷醫者不識呼爲暗風若作此治證必難愈但服清魂散煎膏

薛氏曰產後元氣虧損惡露乘虛上攻眼花頭暈或心下滿悶神

或痰壅盛者，忌用失笑散主之。若血下多而暈，或神昏煩

大劑芳歸湯補之或雲童子散或童子小便有瘀加二陳湯

若因勞心力而致者宜補中益氣湯加香附若因氣血虛極不省

人事用清魂散惟以芎歸湯及大補氣血之劑凡產可用醋漆磨

或用水夏末冷水和丸人鼻孔中並無別患丹溪先生云血暈



保生無憂散  
見前腫月東  
胎方上

產婦不宜飲

因氣血俱虛。痰火泛上。宜以二陳導痰。或加減硃砂安神丸以麥  
門冬湯下亦可。大凡產後口眼喎斜等證。當大補氣血為主。而兼  
以治痰。若脾胃虛而不能固者。用六君子湯。至五個月當服安胎  
散。至八九個月。再加大腹皮黃楊臘。如臨產時。更宜服保生無憂  
散。自無前患。

家人婦產後。小腹作痛。忽牙關緊急。灌以失笑散。良久而甦。又用  
四物加炮薑白朮陳皮而愈。

一產婦因產飲酒。惡露甚多。患血暈。口出酒氣。此血得酒熱而妄  
行。虛而作暈也。以佛手散加乾葛二錢一劑而痊。酒性慄悍。八月  
及產後不宜飲。恐致前證。產室人衆喧嚷。氣熱亦致此證。

奉化陸嚴治新昌徐氏婦病。產後暴死。但胸膈微熱。陸診之曰。此



血悶也。用紅花數十斤，以大鍋煮之。候湯沸，以木桶盛之。將病者寢其上，熏之。湯氣微復加之。有頃，婦人指動。半日遂甦。此與許胤

仲景云產婦胃其脈微弱嘔不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必亡胃家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故常汗出陰陽乃復所以大便堅嘔不能食也小柴胡湯主之病解能食七八日更發熱者此爲胃實人承氣湯主之

今按鬱冒卽暈也觀此則產後血暈有汗下和解三法當分表裏虛實精而別之

今按鬱。即革也。觀此則產後血暈有汗下和解三法。當分表裏虛實精而別之。

清魂散

塵後血暈。氣自暴。暴未得安。靜血隨氣上。迷亂心神。



故眼前生花極甚者令人悶絕不知人口噤神昏氣冷宜先服  
乾漆或漆器燒烟鼻中熏之頻置醋炭房內次進此藥即醒

澤蘭葉 人參各二錢半 川芎半兩 荊芥穗一兩 甘草二錢

右為細末每服二錢用溫酒熱湯各半盞或入童便調急灌之  
下咽眼即開氣定即醒

芎歸湯 治產後去血過多昏暈不醒

芎藭 當歸去蘆酒洗  
焙各半分

右以咀每服四錢水煎熱服不拘時如腹中刺痛加酒炒白  
芍藥甚者加桂心口乾煩渴加烏梅麥門冬發寒熱加乾  
薑白芍藥水停心下微有嘔逆加茯苓生薑虛煩不得眠  
加人參竹葉



保命集方。治產後血暈危。因此下多血虛也補之。

當歸炒 赤芍藥炒各錢半 生地黃汁一大盞

當歸辛溫煩熱者恐不投故去之

右剉水煎三五沸。溫服。如覺煩熱去當歸。八童便半盞服之。以上治去血過多昏暈之疾。

醋墨。纔產便服。免致昏暈。

酒不如醋。醋不如童便。

松烟墨或京墨不拘多少。用炭火煨紅。以米醋淬之。再煨。再淬。如此七次。研極細。纔產畢。即用一二錢。以童子小便調下。淡醋湯溫酒亦可。

獨行散。治產後血暈昏迷不省。冲心悶絕。

五靈脂半生半炒為末。每服二錢。溫酒調灌。入喉即愈。不愈。更加蒲黃炒等分。各失笑散。一方加荆芥等分。童便調下。

金合散。治產後血暈。血入心經。言語不醒。在在從亡失。及產後血暈。



奪命散。治產後血暈血入心經。言語顛倒。健忘失志。及產後百

病。

血竭

沒藥各等分

右為末。纔產下。便用童便與細酒各半盞。煎一二沸。調下二錢。

良久再服。其惡血自下行。更不冲上。或只用白湯調下。

四味散。治產後一切諸疾。纔方分娩。一服尤妙。

當歸

玄胡索

血竭

沒藥各等分

右為細末。每服二錢。用童子小便一盞。煎六分。通口服。如心

膈寒。倍當歸。氣悶喘急。倍玄胡索。惡露不快。倍血竭。心

腹撮痛。倍沒藥。

黑神散。治產後惡露不盡。或胎衣不下。血氣攻冲。心腹痞滿。或



臍腹堅脹撮痛反血暈神昏眼黑口噤產後瘀血諸疾

當歸 芍藥 熟地黄 乾薑炮 桂心 蒲黃

甘草炙各半片 黑豆炒去皮

右為細末每服二錢酒童便各半盞同煎調服○葉氏曰：墨神散寒多及秋冬者宜之。若性急形瘦及夏月宜審之。

紅花散 治產後血昏血暈血崩及月事不勻遠年乾血氣

乾荷葉破

乾荷葉 牡丹皮 川歸 紅花 蒲黃炒各等分

右為細末每服半兩酒煎和渣溫服○如胎衣不下榆白皮湯

調半兩立效

鹿角散 治產後血暈此乃虛火載血漸漸暈將上來用鹿角燒

灰出火毒研極細用好酒童便調灌下一呷即醒此物行血

神方也尤妙在服法

鐵樹金燒存性為末每二錢燒醋一合調灌之立活



鬱金丹 治產後血上冲心已死并下胎

鬱金燒存性爲末每二錢燒醋一合調灌之立活

治血鬱雜方

產後血暈全不省人事極危殆者用韭菜切入有嘴瓶內煎熱醋沃之以瓶口對產婦鼻孔熏之卽醒

一方如覺暈卽以醋嗅面醒來仍與醋細細呷之又以醋塞口鼻并置手旁使常聞其氣

一方麒麟竭二兩細研爲末非時溫酒調下二錢

一方紅花一兩搗爲末分作二服酒二鍾煎取一鍾併服如口緊幹開灌之速效

一方用紅花三兩新者無灰酒重便各半升煮取一盞服之



用剉硝黃法  
亦極安慎  
之

一方用藕木三兩細剉水五升煮取二升分再服瘥無蘇木取紮

衣煎汁服之亦得以上俱破血輕劑

牡丹散治產後血暈悶絕口噤則擗開口灌之

牡丹皮

大黃煨

芒硝各一兩

冬瓜子半合

桃仁三十個去皮尖

右剉每服五錢水三鍾煎至一鍾半去滓入硝又煎分二服

產書一方治產後心煩手脚煩熱氣力欲盡血暈蓮心頭硬及

寒熱不禁

按骨木破之如算子大握以水一升煎至半升分溫二服

或小便數惡血不止服之即瘥此木煎三遍共力一般此是

起死之方以上二方俱重劑點滴不出者宜用

○以上治惡血攻冲昏暈之劑



荆芥散。治產後風虛血暈精神昏昧。

荆芥

一兩  
三錢

桃仁

炒五錢

右為細末。溫水調下三錢。微喘加杏仁炒甘草各三錢。

一方治產後血暈。用荆芥穗為末。童便調下二三錢。極妙。

一方用多年陳荆芥穗。燈烟上燎焦黑存性。每服三錢。童便少酒

調下極妙。

一方治產後血暈身疼直戴眼。口角與目外。咬向上牽急。不知人。

取雞子一枚。去殼取清。以荆芥末二錢。調服仍依次調。荆芥

人不  
可服

○以上治風虛血暈之劑。

倉公散。治產後血厥而冒。

按此乃肝熱  
生風之候。由  
血虛而肝急  
也。然瘥直戴  
眼。俱屬太陽  
要知之。



取定法。痰先通其竅。後補其血也。妙妙。

瓜蒂

藜蘆

白礬各一分

雄黃半

右為末。每用少許。吹鼻取嚏。內服白薇湯。

白薇湯。治產後胃弱不食。脈微多汗。亡血發厥。鬱冒等證。

白薇

當歸各六錢

人參三錢

甘草一錢半

右切。分作二帖。水煎服。

○以土治血厥之劑。

○惡露不下

大全云。夫惡露不下者。由產後臟腑勞傷。氣血虛損。或胞絡挾于宿令。或產後當風取涼。風冷乘虛而搏于血。則壅滯不宜。積蓄在內。故惡露不下也。

薛氏曰。前證若惡露不下。用失笑散。若氣滯血凝。用化莖石散。

此散氣血。勿作前散用。手護也。以人參理中湯加肉桂二錢。神



此產後溫行  
正藥白芍藥  
酒炒亦無妨

此以心神煩  
悶故不用熱  
藥而加重便  
以引下

一產婦遇前證服峻厲之藥惡露隨下久而昏憤以手護其腹余  
曰此皮氣復傷作痛故用手護也以人參理中湯加肉桂二劑補  
之而愈

起枕散。治產後惡血不行心腹及兒枕作痛甚危。

當歸

白芍藥

酒炒各三錢

川芎

二錢

官桂

玄胡索

牡丹皮

蒲黃

炒

五靈脂

炒

沒藥

各一錢

白芷

石劉水煎入童便空心服。

荷葉散。

治產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶。

乾荷葉

二兩

鬼箭羽

桃仁

劉寄奴

蒲黃

各一兩

右為觔末每服三錢以童便一大盞薑三片生大黃一分搗碎

同煎至六分熱服。



通瘀飲。治產後惡露不通。心慌昏沉。寒熱交攻。

歸尾 大黃 各三錢  
白朮 木通 各一錢  
紅花 五分

桃仁 三十箇 搗爛另入

右用水一碗。酒一小盞。煎三沸。入桃仁再煎一沸。溫服。

廣濟方。廢產後惡露不下。

川牛膝 大黃 各二兩  
牡丹皮 當歸 各一兩半  
芍藥

蒲黃 桂心 各一兩

右為末。以生地黄汁調酒服。方寸匕。日三服。血下愈。

保命集方。治婦人惡血不下。

當歸 芫花 各等分

右為細末。每服三錢。酒調下。

芫花大毒。后酒之酌。

此方寒熱並用。逐瘀而不峻。妙在為末。調生地黄汁。酒服。

既用大黃。復用白朮。豈得已之心。加酒同煎。桃仁后入。又治法之妙。

又用芫花。生地黄汁。大黃。童便。酒下。白朮。生地黄。各等分。而勿心。然新絕。脈作。寒熱。腹痛。百脈皆。



又用好墨醋淬末童便酒下

沒藥丸。治產後惡露方行而忽然斷絕驟作寒熱臍腹百脈皆

痛如錐刺非常此由冷熱不調或思慮動作氣所壅遏血畜經絡

當歸

一兩

芍藥

桂心

各半兩

桃仁

去皮尖炒研

沒藥

研各二錢半

硫磺

去翅

水蛭

炒焦各三十枚

右為末醋糊丸如豌豆大醋湯下三丸

黑龍丹

見前脫衣不下

治惡血不下雜方

一。方用蒲黃三兩炒水三升煮取一升頓服

一。方用益母草搗絞汁每服一小鍾入酒一合溫服

虫水蛭非萬不得已不敢用



一方用麻子五升酒一升浸一宿明旦去滓溫服一升不瘥再服一升

血露不絕

大全云夫產後惡露不絕者由產後傷于經血虛損不足或分解之時惡血不盡在于腹中而臟腑挾于宿冷致氣血不調故令惡露淋漓不絕也

薛氏曰前證若肝氣熱而不能主血用六味地黃丸若肝氣虛而不能藏血用逍遙散若脾氣虛而不能攝血用六君子湯若胃氣下陷而不能統血用補中益氣湯若脾經鬱熱而血不歸源用加味歸脾湯若肝經怒火而血不行用加味四物湯若氣血俱虛用十全大補湯若肝經風邪而血沸騰用一味防風丸

以上諸方失載當倣立齊其方

而此方用之

川芎

當歸

芍藥

各等



產後忌芍藥  
而此方用之  
亦血崩者無  
忌耳

有謂如豆汁  
者溫紫黑者  
熱又曰寒過  
多者虛此方  
不寒不熱不  
燥故可通用

敗醬治多年  
疑血產后諸  
病腹痛則此  
去故生新藥  
也

芎歸加芍藥湯。治產後血崩。眩暈不知人事。

川芎 當歸 芍藥各等分

右咬咀。每服四錢。水煎。熱服。○一方加黃芩白水。

加味四物湯。治產後血崩。如豆汁紫黑過多者。

川芎 當歸 芍藥 生地黃 蒲黃 阿膠

薊根 白芷

右水煎服。

一方。瘧產後七八日。惡露不止。

敗醬草 當歸各六分 芍藥 續斷各八分 川芎

竹茹各四分 生地黃炒乾十分

右細剉。以水二升。煮取八合。空心頓服。



○已士補虛之劑

加味四物湯。治產後月餘經血淋瀝不止。此陷下者舉之也。

當歸

川芎

白芍

熟地

白芷

升麻

各一錢

血餘灰

易入

石剉水煎服。

余族弟婦產後半月離蓐過勞下血傾盆急以求救余用此藥一服立止其效如神。

千金方。治產後惡血不盡或經月或半歲者。

升麻三兩清酒五升煮取二升半分溫再服。

○已上升提之劑

烏金散。治產後血迷血暈敗血不止淋瀝不斷臍腹痠痛頭目

昏多汗無力及崩中下血不止。

方之妙不

肉桂

赤芍

延胡索

鯉魚鱗各等分



諸病皆從敗血不止來此方之妙不在止而在行行則歸經而止矣治崩者要得此言

妙在地黃為君

餘血瘀血也故用行法

麒麟竭 男子亂髮灰 松墨炒醋 百草霜 當歸

肉桂 赤芍 延胡索 鯉魚鱗燒存性 各等分

右為末每服二錢空心溫酒調下

一 治產後惡血不絕崩血不可禁腹中絞痛氣急

亂髮燒一兩 阿膠二兩 代赭石 乾薑名三兩 乾地黃四兩

馬蹄殼一個 牛角五兩 酥炙

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十九空心米飲下日二

服

豆淋酒 治產後猶有餘血水氣者

黑豆五升熬令烟盡投磁器內以酒一斗淬之飲盡豆淋酒

治汚血又能發表也



二味有上戰  
且守之能

蒲醋飲子

治新產壓血逐敗。滋新此藥治血神效。又非黑神散

之可比也。月內每日一二服尤良。及療一切惡露與血積。

真蒲黃不拘多少。熬米醋令稠。和藥成膏。每服一彈子。大食  
前醋湯化開服。

一方用蒲黃二兩。水煎頓服。

一方療產後泄血不止。無禁度。及治腹痛胸膈悶。

薑黃為末。酒服方寸匕。日三四服。

胡氏曰。薑黃治惡露不止。

○以上行汚血之劑。

牡蠣散。前產後惡露淋瀝不斷。心悶短氣。四肢之弱。頭目昏重。

五心煩熱。面黃體瘦。

黃連散  
艾葉  
人參  
五味子



牡蠣粉煨

川芎

熟地

茯苓

龍骨各二錢

當歸炒

續斷

艾葉

人參

五味子

地榆各一錢

甘草五分

右剉分三帖加生薑三片棗一枚水煎食前服

○此收澣之劑虛脫者宜用

○血崩不止

陳氏曰產後血崩者。或曰產後傷耗經脈未得平復勞役損重致血暴崩淋瀝不止。或因酸鹹不節傷氣。榮衛衰弱亦變崩中。若小腹滿痛。肝經已壞為難治。急服固經丸止之。

陳無擇評曰血崩不是輕病。產後有此是謂重傷。恐不止酸鹹不節而能致之多。因驚憂恚怒。臟氣不平。或產後服斷血藥早。



致惡血不消。鬱滿作堅。亦成崩中。固經丸。自難責效。不若大料  
養育。窮湯加芍藥。候定。續次。隨證。諸藥。治之。為得。

薛氏曰。前證若血滯。小腹脹滿。用失笑散。血少。小腹虛痞。用窮湯。  
肝火血多。行加味逍遙散。脾鬱不統。血加味歸脾湯。脾氣虛不攝  
血。補中益氣湯。厚味積熱傷血。清胃散加槐花。風熱相搏傷血。四  
君子加防風枳殼。

兒誕在脾胃。  
故用六君加  
炮姜。  
一產婦血崩。小腹脹痛。用破氣行血之劑。其崩如湧。四肢不收。惡  
寒嘔吐。大便秘瀉。余用六君加炮黑薑。四劑稍愈。又以十全大

補三十餘劑而痊。

一產婦血崩。因怒。其血如湧。仆地口噤。目斜。手足抽搐。此肝經血  
耗生風。余用六味丸料一劑。諸證悉退。但食少晡熱。佐以四君柴

胡丹皮而愈。

芩歸加芍藥湯。治產後血崩眩暈。不知人事。

方見前惡露不絕。

加味四物湯。治產後血崩如豆汁。紫黑過多者。

方見前惡露不絕。

奇效四物湯。治產後血崩素有熱者。

方見血崩門。

乾熟地黃散。治產後崩中頭目旋暈。神思昏迷。四肢煩亂。不知

人事。

崩久虛脫者。宜之。

熟乾地黃 黃芩 伏龍肝 赤石脂 各一兩 當歸 七錢

川芎 阿膠 艾葉 白朮 人參 甘草 各半兩



一振固血不  
用補氣猶妙  
有鹿茸謂其  
能引血上升  
也

漢陰雜書

卷十一

方

右吹咀每服四錢生薑三片水煎溫服

阿膠丸治產後崩中下血不止虛羸無力

阿膠 赤石脂各一兩半 續斷 川芎 當歸 丹參

甘草 各一兩 龍骨 鹿茸 炙 烏賊魚骨 鼈甲 炙 各一兩

右為細末煉蜜丸如桐子大空心溫酒下三三十九

瑞蓮散治產後惡血崩漏狀如湧泉

瑞蓮 一百枚 燒存性 棕櫚 燒存性 當歸 各一兩 官桂 半兩 檳榔 二枚

川芎 鯉魚鱗 各七錢 半 亦燒灰用

石為細末每服三錢煨生薑酒調服如未止更進一服或非時

血崩無藥可治但通三服即止

固經丸治產後血氣未復而有身事及勞役傷損致血暴崩或

流注之七傳圖

艾葉

赤石脂 煨 補骨脂 炒 木賊 各半 附子 一枚 炮

溫澁之劑固  
脫以煖下元

此方惟心氣  
鬱者宜之

心痛口產後  
則與尋常之  
病不同矣當  
于血分求之

淋瀝不止

艾葉

赤石脂

煨補骨脂

炒木賊

各半兩

附子

一枚炮  
去皮

右為細末糊丸桐子大每服二十丸溫酒或米飲下

千金方

治產後崩中下血不止

葛蒲二兩半剉酒二鍾煎一鍾去渣分三服食前下

心痛

大全云產後心痛為陰血虧損隨火上冲心絡名曰心胞絡痛宜

大岩蜜湯治之若寒傷心經名曰真心痛朝發夕發朝死無

藥可救

薛氏曰前證若陽氣虛寒用岩蜜湯溫之瘀血上冲用失笑散散

之血既散而痛仍作用八珍湯補之大凡心腹作痛以手按之却



不痛。此血虛也。須用補養之劑。

一產婦患前證。昏憤口噤。冷汗不止。手足厥逆。用六君子加附子。

一錢。以廻其陽。二劑頓甦。又以十全大補湯養其血氣而安。

一產婦患前證。手不敢近腹。用失笑散一服。下瘀血而愈。次日復痛。亦用前藥而安。

一產婦患前證。用大黃等藥。其血雖下。復患頭痛。發熱惡寒。次日

昏憒。自以兩手堅護其腹。不得診脈。視其面。色青白。余謂脾氣虛

寒而痛也。用六君子湯加薑桂而痛止。又用八珍湯加薑桂而安。

大岩蜜湯。一名桂心湯。治素有宿寒。因產大虛。寒搏于血。血凝不散。

上冲心之絡脈。故作心痛。

熟地黃 當歸酒炒 獨活 吳茱萸炒 白芍炒

右剉水煎服。或云熟地黃。泥隔安能去痛。合用生乾地黃。

乾薑

桂心見

小草各一錢

細辛

甘草各五分

右剉水煎服。或云熟地黄。泥隔。安能去痛。合用。生乾地黄。

失笑散。

治產後惡血上攻。心腹疼痛欲死。及兒枕痛。或牙關緊。

急。一服可愈。

蒲黃

炒

五靈

各一錢

右為細末。作一服。

醋調。水一盞。煎服。

金黃散。

治惡血上。

心腹作痛。或發熱。作渴。

延胡索

蒲黃

各二錢

桂心二分

右為末。酒調服。

火龍散。

治產後氣逆心痛。

茴香

炒

川練

炒各一兩

艾葉

鹽炒半兩

右為末。水煎服。

伏龍肝散。

治產後惡物不出。止攻心痛。

齊集綱目

卷之二十一 心痛

三



狗胆能破瘀  
血用桂心更  
治絕悶妙

赤伏龍肝。研細每服三五錢。溫酒調下。瀉出惡物立止。

一方。治產後惡血冲心痛。氣悶欲絕。

用桂心三兩。搗為細末。狗胆汁和凡如櫻桃大。每服二丸。熱

酒調下。不拘時。

一方。治產後血不盡。心腹痛。

荷葉炒令香為末。水煎下方寸匕。

○腹痛並小腹痛

薛氏曰。產後小腹作痛。俗名兒枕塊。用失笑散行散之。○若惡露

既去而仍痛。用四神散調之。若不應用八珍湯。○若痛而惡心。或

欲作嘔。用六君子湯。○有痛而泄瀉。用六君子湯。送四神丸。○若

泄瀉痛而後或後重。用補中益氣湯。送四神丸。○若胸膈飽脹。

按腹屬脾。文  
尚有數症。曰  
因氣滯用玄  
胡索散因外  
寒用五積散  
因怒氣用四  
物如不香紫

以消通。若人食飲滯而仍痛。或按之不痛。或更加頭痛。煩執作渴。惡

弱用四君當  
 歸炮姜因脾  
 虛血弱用六  
 君當歸炮姜  
 發渴惡屬虛  
 虛用白虎宜  
 慎東垣云血  
 虛忌白虎  
 因室成虛因  
 虛後補當與  
 勿當醫者病  
 者兩責之幸  
 勿誤也

惡食吞酸或脘痛手不可按此是飲食所致用二陳加山查白朮  
 以消導若食既消而仍痛或按之不痛或更加頭痛煩熱作渴惡  
 寒欲嘔等證此是中氣破傷宜補脾胃為主○若發熱腹痛按之  
 痛甚不惡食不吞酸此是瘀血停滯用失笑散消之○若止是發  
 熱頭痛或兼腹痛按之却不痛此屬血虛用四物加炮薑參朮以  
 補之○如發渴用白虎氣弱用黃耆血刺痛則用當歸腹中痛則  
 加芍藥宜詳察脈證而用之

一產婦腹痛發熱氣口脈大余以為飲食停滯不信乃破血補虛  
 反寒熱頭痛嘔吐涎沫久用降火化痰理氣四肢逆冷泄瀉下墜  
 始悔問余曰何也余曰此脾胃虛之變證也法當溫補遂用六君  
 子加炮薑二錢肉桂木香各一錢四劑諸症悉退再則補中益氣



之劑元氣遂復

一婦人產後腹痛後重去痢無度形體倦怠飲食不甘懷抱欠鬱

患滿腹殊而盜汗如竟夜不敢寐神思消燼余曰氣血虛而有

熱用當歸六黃湯內諸琴黃葉炒黑二劑汗頓止再劑全止乃用

歸脾湯八珍散兼服元氣漸復而愈

一產婦小腹作痛服行氣破血之藥不效其脈洪數此瘀血內潰

為膿也以瓜子仁湯二劑痛止更以太乙膏下膿而愈產後多有

此病縱非癰用之更效

注意

一產婦小腹痛小便不利用薤白仁湯二劑痛止更以四物加紅

花柳仁下瘀血而愈此證皆因榮衛不調或瘀血停滯所致

若脈洪數已有膿脈但數微有膿脈遲緊乃瘀血下之即愈若腹

滿唇因虛  
以脹症參之

及托裏散

脹大轉側作水聲或膿從臍出或從大便出宜用蠟鑿九太乙膏及托裏散

一產婦小腹有痛有塊脹花而滿以四物加玄胡紅花桃仁牛膝木香治之而愈

一婦產後小腹患痛服瓜子仁湯下瘀血而痊凡瘀血停滯宜急治之緩則腐化為膿最難治療若流注關節則患骨疽失治多為敗證

覺石有塊是寒氣乘虛而聚非真實症也不然何以羊肉熱地愈哉

一婦人寒月中產後腹大痛覺有塊百方不治一人教以羊肉四兩熟地黃二兩生薑一兩水煎服之三次愈

大全云兒枕者由母胎中宿有血塊因產時其血破散與兒俱下則無患也若產婦臟腑風冷使血凝滯在于小腹不能流通則令



經曰惡露不  
盡。人便而  
躁發熱。然不  
用桃仁。示氣  
而用大承氣  
者。因益熱結  
在膀胱故宜  
大承氣也。

結聚疼痛。名之曰兒枕。

金匱云。產後七八日。無太陽證。少腹堅痛。此惡露不盡。不大便。煩躁發熱。切脈微實。再倍發熱。日晡時煩躁者。不食。食則譫語。至夜即愈。宜大承氣湯主之。熱則裏結在膀胱也。

大全云。產後惡血。雖常通行。或因外感五邪。內傷七氣。致令斬然而止。餘血壅滯。所下不盡。故令腹痛。當審其因而治之。

一產婦小腹痛甚。牙關緊急。此瘀血內停。灌以失笑散。下血而甦。又用四物加炮薑白朮陳皮而愈。

一婦人經水來。比常度過多不止。遂用瀉藥止之。致腹作痛。此乃氣血凝滯也。用失笑散二服而愈。

以上數段。惡露不盡。

實執言。當以無太陽陽證。句及熱結膀胱句。玩之。便得其意。後

寒疝大全云  
產後臍虛痛  
乃冷氣乘虛  
用當歸建中  
湯無擇曰產  
當寒月入門  
臍下痛手不  
可近者羊肉  
湯立瘳且前  
症若脾胃虛  
寒邪侵者蟠  
葱散若肝經  
濕熱小便不  
利者瀉肝湯

余按金匱所治重在傷寒裏實不重在惡露故其脹證皆指實熱言當以無太陽證句及熱結膀胱句玩之便得其意後案專主惡露言故與前方不同不可一律看也

大全云以惡露不盡腹痛及兒枕心腹刺痛小腹疼痛寒疝分為四門由母胎中宿有血塊產後不與兒俱下而仍在腹作痛謂之兒枕其惡露下不快而作痛者胎中原無積聚不為兒枕也若惡露已盡或由他故腹痛如仲景枳實芍藥散證或由血虛腹痛如仲景當歸生薑羊肉湯證自當別論故復臚列諸名方于後若服枳實芍藥散不愈仍當求責瘀血也故下瘀血諸方附焉而補虛諸方終之不復立寒疝條

加味四物湯 治產後惡露不盡腹痛



亦所當知母  
膠二也

此所加六種  
藥少有差等  
宜自擇之

桂心血竭治  
血痕妙

當歸

川芎

芍藥

熟地黃各一錢

香附炒

五靈脂炒二味另為末各一錢臨服調入

右剉一服水煎服○痛甚者加桃仁泥四分

海藏方四物湯加玄胡索沒藥白芷治產後敗血作痛

一方四物湯加苦棟  
一方四物湯加玄胡索

一方四物湯加蒲黃

當歸蒲延散治產後血痕作痛臍下脹滿或月經不行發熱體

倦

當歸八分

桂心

芍藥炒

一血竭

蒲黃

炒各六分

延胡索

炒四分

右為末每服二錢空心酒調下

玄胡索散。治產後惡血攻刺腹痛。及一切血氣刺痛。不論新舊。虛實皆可服之。

當歸酒

玄胡索

赤芍藥

蒲黃隔紙炒

桂皮

乳香

沒藥各等分

右研為細末。每服三錢。溫酒調空心服。

延胡散。治產後見枕腹痛。

延胡索

當歸各一兩

赤芍五錢

肉桂七錢半

蒲黃炒

更加紅藍琥  
珀治見枕猶  
奴

琥珀各二錢半

紅藍花二錢

右為末。每服二錢。童便合酒調。食前服。

烏金散。治惡露敗血。走刺心腹。見枕痛。坐臥不得。餘血不快。

川芎

七錢半燒然  
蓋罇中存性

黑附子

半枚炮  
去皮齊

燒川芎用黑  
附者溫血海

齊金綱目

卷十一 腹痛

二五



之裏也。

右為細末。每三錢薑便和酒調服。痛止血下。方佳服。

地黃散。治產後惡血不盡。腹中疔痛。

生地黃

炒

當歸

炒各一兩

生薑

五錢切碎新瓦上炒令焦黑

右為細末。薑酒調下二錢。空心服。一方加蒲黃為丸。

四神散。治產後瘀血不消。積聚不散。作塊。心腹切痛。

當歸

乾薑

炮川芎

赤芍

炮各等分

右為末。每服二錢。溫酒調下。

黑神散。治產後血塊痛。

熟地黃

一斤

陳生薑

半斤

右二味。拌勻。同炒乾。為末。每服二錢。烏梅湯調下。常服酒調。

丹還方。治產後血塊痛發熱。

右研細分五帖。豆淋酒下之。食前服。

五靈脂四錢炒

牡丹皮

沒藥

滑石

右研細分五帖豆淋酒下之食前服

卷荷散治產後血上冲心血刺血暈血氣腹痛惡露不快並皆

治之

初出卷荷

紅花

當歸各一兩

蒲黃紙炒牡丹皮各半兩

右為細末每服三錢空心鹽酒調下

荷葉散治產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶

乾荷葉二兩

劉寄奴

蒲黃各一兩

桃仁去皮尖燉炒半兩

均是破血藥而治煩悶之症則童便生地猶佳

右吹咀每服四錢童子小便一盞生薑三片生大黃一分煎至六分熱服不拘時一方有鬼箭羽

隱居澤蘭湯治產後惡露腹痛或胸滿少氣



澤蘭理血氣  
聖藥

澤蘭炒

生地黃

當歸

芍藥炒

生薑各錢

甘草五分

大棗四個

右剉水煎服。

又方。治產後下血不盡。腹內堅痛不可忍。

當歸

芍藥

桂心各三兩

桃仁一百二十粒製

右水六升。煮二升。溫分二服。未差加大黃。

又方。治產後惡露不盡。結聚小腹疼痛。

當歸七錢半

香附子製一兩

赤芍

青皮

木香

桂心

琥珀

沒藥各半兩

右為細末。以烏豆淋酒調服二錢。

產寶湯。

治產後餘血作痛。兼塊者。

妙在加大黃。  
然以醋製者佳。

延胡索。治產後臍下痛。並腰疼。

桂心 薑黃各等分 右為細末酒調方寸七血下盡妙

延胡索一名三聖散 各如神湯 治產後臍下痛並腰疼

延胡索 桂心各半 當歸一兩 右為細末熱酒調下二錢

香桂散 治產後臍下疼痛不止

當歸 川芎各二錢半 桂心半兩

右為細末分為三服每服酒一盞煎三五沸更入童便少許煎

至七分溫服甚重不過再服即瘥

當歸血竭丸 治產後惡露不盡結聚成塊心膈痞悶及臍下堅

痛

當歸 血竭 芍藥 蓬朮炮各二兩 五靈脂四兩

右為細末醋糊和丸如梧桐子大每服五十九食煎溫酒送下

破血為主



產後惡露不盡  
 腹痛腰痛  
 下血不止  
 治法  
 久不愈  
 有風寒  
 補血  
 產後失血  
 之經

當歸養血丸 治產後惡血不散發渴心腹疼痛及惡露不快臍

下急痛連及腰脚疼痛

當歸 赤芍 牡丹皮 延胡各二 桂心一

右為末煉蜜丸如桐子大空心酒下三四十丸痛甚者細嚼下

紫蓋丸 治產後惡露不快腰腹小腹如刺時作寒熱頭痛不能

飲食亦治久有瘀血月水不調亦可療心痛

五靈脂 小洗去上石 煨乾炒為末 真精黃各等

右以好米醋調五靈脂慢火熬成膏次以蒲黃末搜和丸如櫻

桃大每服一丸水與酒便各半盡服至七分令藥化溫服之少

頃再服惡露即下久有瘀血成塊月信不利者並用酒磨下

玉燭散 治產後惡露不盡臍腹疼痛大便燥結時發寒熱

主之  
 左作一服水煎食前溫服  
 諸方治敗血作痛皆是溫劑

此河間法也  
四物合承氣  
主之為鹹走  
血之意

一貴為產后  
脈沉小如絲  
腹痛不能食  
聞藥則嘔以  
此方三服而  
愈  
此仲景方也  
又為經少不  
利要藥  
豚肝者即乾

當歸 川芎 赤芍 熟地 大黃 朴硝 甘草 冬月二錢半

右作一服水煎食前溫服○諸方治敗血作痛皆是溫劑熱則流通之理惟此一方却是涼劑益為敗血凝滯發熱大便燥結者設也非大便秘結者慎不可用

枳實芍藥散 金匱云產後腹痛煩滿不得卧此方主之

枳實 炒令黑勿太過 芍藥 各等分

右杵為散服方寸匕日三服並主癰膿以麥粥下之

下瘀血湯 產婦腹痛法當以枳實芍藥散假令不愈者此為腹

中有乾血着臍下宜此方

大黃 兩 桃仁 二十枚 蟅蟲 二十枚炒去足

右三味末之煉蜜和為四丸以酒一升煎一丸取八合頓服之



血之下也新  
血二字非

新血下如豚肝

保命方

治血暈血結或聚于胸中或偏于小腹或連于脇肋四

物湯四兩倍當歸川芎加鬼箭羽紅花延胡各二兩同為釐末

加下四味煎調沒藥散服

蠱蟲二錢去  
翅足炒

水蛭一錢  
炒

麝香少  
許

沒藥

石為末入前藥調服血下痛止則服一服

千金桃仁芍藥湯治產後腹痛

桃仁

芍藥

川芎

當歸

桂心

乾漆碎  
炒

甘草各二  
兩

右細切木八升煮二升半分三服

以上治瘀血腹痛之劑皆重劑宜斟酌用之

增損四物湯。治產後陰陽不和。在寒在熱。惡露停滯。亦令寒熱。

但看小腹急痛為異。

當歸酒。白芍。川芎。人參各一。甘草炙半。

乾薑二兩。

右咬咀。每服四錢。薑三片。水煎。無時熱服。

獨聖散。治產後血虛腹痛。

當歸一味。為細丸。每服二錢。水一盞。煎七分。溫服。

當歸散。治產後陰血虛弱。或氣滯血凝。以致發熱腹痛。或腹脇

脹滿。

當歸。乾薑各等分。

右剉。每服三錢。水煎服。

此方簡易。有獨見。而當歸又能治酒。酒寒熱不已。



定痛散。治產後惡血不止。

當歸

芍藥

炒各二錢

肉桂

一錢

右切作一服。水酒各一盞半。加生薑五片。煎一盞服。

當歸建中湯。

治婦人產後虛羸不足。腹中刺痛不止。吸吸少氣。

或苦小腹中急痛。引腰背不能飲食。

當歸

四兩

芍藥

炒六兩

桂枝

三兩

甘草

炙二兩

生薑

三兩

大棗

十二枚

右六味以水一斗。煮取三升。分溫三服。一日令盡。若大虛加

飴糖六兩。湯成內干火上煖。令飴消。若去血過多。崩傷內血

不止。加地黃六兩。阿膠二兩。合八味湯內。阿膠服之。

羊肉湯。

治產婦脾虛為寒邪所乘。以致腹痛。及寒月生產寒氣

血動不止。加地黃阿膠。似次但本方有桂枝生薑。請酌之。

入于丁。桂枝。阿膠。下。腸。痛。手。不。可。伸。

當歸

川芎。各。半。

生薑。一。

元本經年譜  
羊肉湯  
治產婦脚腫身重氣短者服之  
久其自生法  
羊脂膏

入于產門。臍下脹滿。手不可犯。

精羯羊肉

四兩

當歸

川芎

各半兩

生薑

一兩

右以水十盞。酒三盞。煎至四盞。分四次空心服。加葱鹽亦可。

衍義云。一婦人產當寒月。寒氣入產門。臍下脹痛。手不得犯。此

寒疝也。醫當治之。以抵當湯。謂其有瘀血耳。予教之曰。非其治

也。可服張仲景羊肉湯。少減作二服。愈。

千金方。治產後餘疾。腹中絞痛。瘦乏不下食。

當歸

黃芪

芍藥

各六錢

乾地黄

白朮

各八分

桂心

甘草

各四分

大棗

十枚

右咬咀。水二升。煮八合。空心服。忌生冷。

○以上治虛寒腹痛之劑。

與前增損四  
物湯相上下  
用者當合視  
之



生料五積散。治產後內有餘血。外感寒邪。相搏而腹痛。

蒼朮 二錢四分

麻黃 去根節

橘紅

枳殼 各六錢

桔梗 一錢二分

厚朴

乾薑 炮各四錢

當歸

白芍

川芎

白茯苓

半夏

白芷

肉桂

甘草 炙各三分

右加薑葱米煎服。

○右方治寒邪腹痛之劑。非真受寒氣者不可輕用。

○脇脹痛

大全云。產後兩脇脹滿。氣痛。由膀胱宿有停水。因產後惡露不下。

盡水壅滯。與氣相搏。積在膀胱。故令脇肋脹滿。氣與水相激。故令

痛也。

薛氏曰。前症若肝經血瘀。用玄胡索散。若肝經氣滯。用四君子小

玄胡索散。見前腹痛條。

脇脹痛。由膀胱停水所致。是何見解。用何湯藥。考。

之。無。不。一。水。不。足。不。能。生。肝。用。六。味。丸。是。白。肺。金。勢。盛。刺。制。肝。木。用。瀉。白。湯。仍。

俱屬肝經而柴胡若肝經血虛用四物參朮此胡氣血俱虛用八珍此柴胡若腎有勝於寒制之異故治不同

參前論主之

一產婦因怒兩脇脹痛吐血甚多發熱惡寒胸腹脹痛余以為氣血俱虛用八珍加柴胡丹皮炮薑而血頓止又用十全大補湯而寒熱漸退此症苟非用薑桂辛溫助脾肺以行藥勢不惟無以施功而反助其脹矣

乾地黃湯治產後兩脇滿痛兼除百病

乾地黃

芍藥各三兩

當歸

蒲黃各二兩桂心六兩

甘草一兩

生薑五兩

大棗二十枚

右咬咀以水一斗煮取二升半分服日三

肝謂木得桂而情故用之以治脇痛然不可不審寒此方以往心為君而以血藥為輔用之以溫肝家血寒之病則可用之以治肝



火伯而則不  
可須王解之  
生天然亦  
氣滯二字盡  
之

經效方

治產後肝經氣滯不平脇脹腹痛或寒熱往來內熱瞞

熱

當歸一錢半

芍藥炒

苦梗

檳榔

枳殼麩炒各八分

桂心

青木香

柴胡各六分

右剉水煎服

蘇葛湯

瘧產後惡露不下血氣壅滯脇脹痛不下食

蘇木

紫葛各十分二分

芍藥

當歸各八分

桂心

蒲黃各六分

生地黄升三合

右咬咀以水二升煎七合下蒲黃分兩服

經效方

理血氣煩悶脇肋脹滿及痛

芍藥八分

當歸六分

延胡索

蒲黃各四分

荷葉葉炙三枚

行血為主

行血生

有以矣

生血生

延胡索

生血生

生血生

右水二升煎取八合後入蒲黃空心分二服

當歸散 治產後腹痛脇肋脹滿

當歸 乾薑各等分

右為末酒服三錢水煎入鹽醋少許食前熱服方酒煎

麝香方 療產後腹痛氣脹脇下悶不下食兼微利

厚朴八分 人參 當歸 茯苓 甘草各分

陳皮 生薑各四分

右以水二升煎取八合去滓分溫服

抵聖湯 治產後腹脇悶滿或嘔吐者

赤芍 半夏 澤蘭葉 陳皮 人參 甘草各等分

右以水二升煎取八合去滓分溫服

此方治氣血虛滯脾胃不足者尤宜

以上七方並用川芎腹脇痛者不宜服要知此脈此

千金方

卷十一 婦人

三



理

○腰痛

大全云。腎主腰脚。產後腰痛者。為女人腎位。繫于胞產。則勞傷腎氣。損動胞絡。虛未平復。而風冷客之。冷氣乘腰。故令腰痛也。若寒冷邪氣。連滯脊脊。則痛久未已。後忽有娠。必致損動。蓋胞絡屬腎。腎主腰故也。

薛氏曰。前證真氣虛邪乘之者。用當歸黃芪湯。或十全大補湯。為主佐。以寄生湯。如不應。用十全大補加附子。

一產婦腰痛腹脹。善噫。諸藥皆嘔。余以為脾虛血弱。用白朮一味。炒黃每劑一兩。米泔煎。欲時匙許。四劑後。漸安。百餘劑而愈。

當歸黃芪湯。治產後失血過多。腰痛。身熱自汗。

諸藥皆嘔。但用白朮而分兩煎服法。皆妙。

當歸一兩

黃芪

白朮

炒各二兩

右咬咀。每服六錢。加生薑五片。水一盞半。煎至一盞。溫服不拘時。

玄胡四物湯。治血癖腹痛及血刺腰痛。

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃各七錢半

玄胡索水煎兩 右為細末。每服三錢。酒調下。

如神湯。治產後瘀血腰痛。

延胡索 當歸 桂心各等分 右水煎服。

又如神湯。即主料五積散加桃仁 逐敗血去風濕。

五積散。方見前腹痛條。

廣濟方。治產後虛冷。血氣流入腰腿痛不可轉。

敗醬 當歸各八分 川芎 芍藥 桂心各六分

血凝者其之  
情敗之難



竟也

此方治久痛  
之因外感者

卷二十一

三

右吹明水二升煮取八合分温二服忌葱

寄生防風湯 治產後風邪頭眩腰痛不可轉側四肢沉重行步

艱難

濁活

川芎

芍藥炒黃

桂心

續斷

生薑

桑寄生各六分

當歸

防風各八分

右剉水煎服

桃仁湯 治產後惡露不行忽然漸少斷續不來腰中重痛或流

注兩股痛如錐刺此由血滯于經絡不即通之必作瘕瘕宜桃

仁湯恐有瘕者預服五香逆翹湯

桃仁尖

蘇木

生地各半

蟪蟲去翅

水至妙各三

十筒

右每服三錢水煎空心熱服惡露下即佳服

木香

丁香

沉香

乳香

射香

升麻

既為瘀血何  
以只用五香  
行氣益為病  
血于氣也  
射香分兩想  
誤

以風寒所傷  
而用補中益  
氣尚須斟酌

五香連翹湯 治產後瘀血腰痛作癰

木香

丁香

沉香

乳香

射香

升麻

獨活

桑寄生

連翹

木通

各二兩

右為麤末每服五錢水煎入竹瀝少許服

○頭痛

大全云夫頭者諸陽之會也凡產後五臟皆虛胃氣虧弱飲食不  
克穀氣尚之則令虛熱陽氣不守上壅于頭陽實陰虛則令頭痛  
也○又有產後敗血頭痛不可不知黑龍丹言之甚詳

薛氏曰前證若中氣虛用補中益氣湯加蔓荊子若血虛用四物  
加參朮血氣俱虛用八珍湯若因風寒所傷用補中益氣湯加川  
芎



一產婦患頭痛日用補中益氣湯不缺已三年矣稍勞則惡寒內熱爲陽氣虛以前湯加附子一錢數劑不發

一婦人產後頭痛面青二年矣日服四物等藥余謂腎水不能生肝木而血虛用六味九加五味子兩月而瘥

郭茂怕嫂金華君產七日不食始言頭痛頭痛已又心痛作既而目睛痛如割如刺更作更止相去無瞬息間每頭痛甚欲取大石壓良久漸定心痛作則以十指抓臂血流滿掌痛定目復痛又以兩手自剜取之如是十日不已衆醫無計進黑龍丹半粒疾少間中夜再服乃瞋目寢如平時至清晨下一行約三升許如蛇蟻子三疾減半已刻又行如前則頓愈矣此虫咬痛也不如川殺虫藥更神效

黑龍丹見肥衣不下條

一奇散即芎歸湯治產後血虛頭痛

右爲細末每服一錢或水一盞煎七分溫服

服法佳

產後頭痛。至  
于內虛正治  
也。求之療血  
變法也。但瘀  
血而非瘀血  
反下如蟬更

當歸

川芎各二錢半

右為細末每服一錢水一盞煎七分溫服

芳烏散。治產後氣滯頭痛。

天台烏藥

大川芎各等分

右為細末每服三錢燒紅秤鍾淬酒調服

青附散。治產後氣虛頭痛及敗血作梗頭痛諸藥不效者。

川芎一兩

大附子

一箇去皮臍切四片拌醋一

右為末每服二錢清茶調服

加減四物湯。治產後頭痛血虛痰癖寒厥皆令頭痛。

蒼朮

一兩大錢

羌活

川芎

防風

香附炒

白芷

各一兩

石羔

二兩半

細辛

一兩半

當歸

甘草

各五錢



子皆怪其  
痰癖重  
此則又謂之  
雜症矣  
有者求之無  
拾求之豈可  
此一戰如雷  
上

按此其妙  
積散方即是  
何也詳五  
脈乃不論及  
此則又謂之  
雜症矣

右劉每服一兩水煎服無時○如有汗者知氣虛頭痛也加芍  
藥三兩桂一兩半生薑煎○如熱痰頭痛加白芷三兩石膏三  
兩知母二兩○如寒厥頭痛加天麻三兩附子二兩半生薑三  
片煎服○

○遍身疼痛

大全云產後遍身疼痛者何答曰產後百節開張血脈流散遇氣  
弱則經絡肉分之間血多流滯累日不散則骨節不利筋脈急引  
故腰背不得轉側手足不能動搖身熱頭痛也若證以為傷寒治  
之則汗出而筋脈動惕手足厥冷變生他證但服趁痛散除之  
薛氏曰前證若以手按而痛甚是血滯也用四物炮薑紅花桃仁  
澤蘭鋪而散之若按而痛稍緩是血虛也用四物炮薑人參白朮

補而養之。

一產婦身腹作痛發熱不食煩躁不寐盜汗脇痛服解散祛血之藥不時昏倒六脈洪大如飢用補中益氣加炮薑半夏一劑頓退二三又劑寢食甘美但背強而痛用八珍散大補湯調理而安一產婦遍身頭頂作痛惡寒拘急脈浮緊此風寒之證也用五積散一劑汗出而愈但倦怠發熱此邪風去而真氣虛也用八珍湯調理而痊。

一婦六月產後多汗人倦不敢袒被故汗出被裏冷則浸漬得風濕疼痛遂以羌活續斷湯數服而愈。

趁痛散。治產後氣弱血滯筋脈拘攣腰背強直遍身疼痛。

當歸

官桂

白朮

黃芪

獨活

牛膝

此方根氣弱  
疼故用芪朮

卷之十一

一婦身夜痛

三



若外感者不可輕用

此專治血統諸經青腫在痛

只此四方類有法目之

濟陰經

名十一

卷一

三

生薑各五錢

甘草炙

芫白

各三錢半

右咬咀每服五錢水煎服○加桑寄生半兩尤佳

五積散治產後身痛兼感寒傷食

方見前腹痛條○與四物湯各半服之穩當

加味四物湯治產後血虛身痛

當歸

川芎

人參

芍藥

熟地

白朮

乾薑炒各二錢

右剉作一服水煎服

大千方治產後遍身青腫疼痛及眾疾

牛膝

大麥蘖

各等分

右為細末以新瓦罐子中填二重麥蘖二重牛膝如此填滿用

鹽泥固濟火煨過赤放冷研為散但是產後諸疾熱酒調下二

脚氣

錢

脚氣

大全云。產後熱悶氣上。轉為脚氣者。何。答曰。產臥血虛生熱。復因  
 春夏取涼過多。地之蒸濕。因足履之。所以着為脚氣。其狀熱悶。掣  
 癢驚悸。心煩嘔吐。氣上皆其候也。可服小續命湯。方見後兩三劑  
 必愈。若醫者誤以逐敗血藥攻之。則血去而疾愈增矣。中風條

陳無擇評曰。脚氣固是常病。未聞產後能轉為者。往讀千金見產  
 婦多有此疾之語。便出是證。文辭書意。蓋可見矣。設是熱悶氣上  
 如何。便服續命湯。此藥本主少陽經中風。非均治諸經脚氣。要須  
 依脚氣方論。陰陽經絡調之。此涉專門。未易輕論。既非產後要病。  
 更不繁引。



平繩云陳無擇雖有此論然小續命湯加減與之用無不效故百

問云寒中三陽所患必冷小續命湯主之加生薑汁更快暑中三陰所患

必熱小續命湯去附子減桂一半大煩躁者紫雪最良予取百間中加減法庶使後人均得

治如無紫雪用真薄荷煎冷水隨下婁云諸方必與四物湯各半服之

薛氏曰前證當補氣血為主佐以小續命湯寄生湯如不應服用大

防風湯

一產婦患前證或用獨活寄生湯而痊後復作服前湯其汗如水

更加口噤吐痰余用十全大補湯倍養血氣漸愈後飲食日少肌

體日瘦吐痰如湧此命門火衰脾土虛寒川八味丸及加味歸脾

湯諸證漸退肌肉漸生

獨活寄生湯治肝腎虛弱或久履濕冷之地或洗足當風濕毒

內攻兩脰緩縱攣痛痺弱或皮肉紫破足膝攣重又專治產後脚氣

川獨活兩三

桑寄生如無以續斷代

杜仲炒

牛膝去蘆酒浸

細辛

官桂不見火

白茯苓

防風

川芎

當歸

人參

熟地黄酒洗

芍藥

秦艽各二兩

甘草炙一兩

右咬咀每服四錢薑五片水煎溫服

大防風湯治陰虛邪襲腿膝腫痛等證

防風

附子炮

牛膝酒浸

白朮炒

羌活

人參

肉桂

黃芪炒各一錢

熟地黄各一錢

芍藥炒

杜仲

姜汁炒

甘草炙各五分

按二方俱小續命湯變法但去麻黃而佐四物是不含產後二字



右劉水煎服

卷之二終

開中

武之望叔卿父輯著

武林

朱長春秉年父訂正

濟陰綱目卷之十二

關中 武之望叔卿父輯著 武林 朱長春秉年父訂正

西陵 汪 淇懽子箋釋 天都 查 望于周父叅閱

○外感風寒

寒熱似瘧  
瘧疾歌是  
下散頭交消  
息酌用

李氏曰。產後外感。離牀太早。或換衣襲風。冷入下部。令人寒熱似瘧。頭疼。不眠。血虛者。芎歸湯加人參。紫蘇。乾薑。而氣虛者。補虛湯加陳皮。乾薑。寒熱甚者。熟料五積散。熱不止者。黃龍湯主之。如體盛發熱。惡寒及瘧痢者。小柴胡湯合四君子。四物湯加黃芩。各三分。散切。不可以傷寒治法。若誤服熱藥過多。熱證大見。久而便閉者。柴胡破瘀湯。或四物湯加大黃。芒硝。暫服。即調補之。

良方曰。產後外感風寒。發熱頭痛身疼。雖如傷寒。時氣當用麻黃。

嘆驚語



以嘔加地黃  
宜酌用

亦不可輕易。如早起勞動。為寒所傷。則淅淅惡寒。翁翁發熱。頭項  
肩背骨節皆痛。至七八日。乃差。若大便堅。作嘔不能食。用小柴胡  
湯。加生薑地黃。

大虛癰症

吳氏曰。新產後。遇傷寒。不可輕易發汗。蓋有產時傷力。發熱去血  
過多。發熱惡露不去。發熱三日。蒸乳發熱。或有早起勞動。飲食停  
滯。一皆發熱狀類傷寒。要在仔細詳辨。切不可輒便發汗。大抵產  
後大血空虛。若汗之。則變心忪肉瞤。或轉目昏迷。而不省。或風摘  
搦而不定。或大便閉澀而難去。其害非輕。切宜詳審。凡有發熱。且  
與四物湯。以川芎當歸為君。最多。白芍藥須炒過。酒蒸熟。地黃佐  
之。如發熱。加軟荳蔻。胡人參。乾薑炮之。最効。蓋乾薑之辛熱。能引  
血藥入血分。氣藥入氣分也。且能去惡養新。有陽生陰長之道。以

未盡者。益母丸。黑神散。必兼用之。若日虛少食者。必加白朮茯苓。

血氣入血分。氣入氣分也。且能去惡養新。有陽生陰長之道。以

等分法乃善  
守法

仲景所謂中  
風。即今人所  
謂傷風。陽旦  
湯者。從仲景  
方也。

熱治熱。深合內經之旨。予嘗用之。取効如神。故錄以勸。如有惡露  
未盡者。益母丸黑神散。必兼用之。若目虛少食者。必加白朮茯苓。  
有痰嘔逆者。必加陳皮半夏。其餘六經各條治例。皆同。但藥中必  
加四物湯為主。乃養血務本之要也。  
大全云。凡產後發熱頭痛身疼。不可便作感冒治之。此等多是血  
虛。或敗血作梗。宜以平和之劑與服。必効。如玉露散。或四物湯加  
北柴胡等分煎服。若便以小柴胡湯及竹葉石膏湯之類。竟不救  
者多矣。

產後中風。數日不解。頭微痛。惡寒。時時有熱。心下悶。乾嘔。汗出。  
雖多陽旦證耳。可與陽旦湯。即桂枝湯。方見傷寒。  
加味芎歸湯。治產後血氣虛。外感風寒。頭疼。增寒壯熱。

齊民要術

卷之二十二 外感風寒

七

齊民要術



當歸

川芎

各二錢

人參

紫蘇

乾葛

各一錢

右劉加生薑三片水煎服。

以竹葉乾葛

竹葉湯。

治產後中風

發熱面赤喘而頭痛。

竹葉

葛根

防風

桔梗

桂枝

人參

甘草

各一兩

右吹咀每服五錢。棗一枚薑五片水一盞半煎一盞去滓服溫。

覆使汗出若頭項強用大附子半錢煎藥揚去沫嘔者加半夏

一錢。

○中風

大全云。夫產後中風者由產時傷動血氣勞損臟腑未會平復早

起勞動致使氣虛而風邪乘虛入之故風邪冷氣客于皮膚經絡

用血藥而用參桂從中風也此雖大法須用斟酌附子亦須善用。

邪氣虛入外固也若由藏便不可治矣即治亦須從

虛弱若入諸病恍惚驚悸隨其所傷肺臟經絡而生病焉。

本氣為主

但疼痺羸之。不任少氣。太凡筋脉。挾寒則攣。急喘僻挾濕則縱。緩虛弱。若入諸藏。恍惚驚悸。隨其所傷。腑臟經絡。而生病焉。

郭稽中論曰。產後中風者。何容曰。產後五七日內。強力下床。或一月之內。傷子房室。或懷憂怒。擾盪冲和。或因食生硬。傷動藏府。得病之初。眼澀口噤。肌肉攣摘。漸至腰脊筋急。強直者。不可治。此乃人作。非偶爾中風所得也。

產後中風。風藥不可擅用。

薛氏曰。前證果外邪所襲。形氣不足。病氣有餘。當補元氣為主。稍佐以治病之藥。若強力不休。月內入房。屬形氣俱不足。當純補元氣。多有復甦者。若誤投風藥。乃促其危也。

丹溪曰。產後中風。口眼喎斜。必用大補氣血。然後治痰。當以左右手脉。分其氣血多少。以治切。不可作中風治。而用小續命湯及發



表治風之藥

大全云產後下血過多虛極生風者何答曰婦人以榮血為主因產血下太多氣無所主唇青肉冷汗出目眩神昏命在須臾者此虛極生風也宜急服濟危上丹若以風藥治之則誤矣

薛氏曰前證若心脾血氣俱虛用大補湯如不應加附子鈎藤鈎若肝經血虛用逍遙散加鈎藤經云脾之榮在唇心之液在汗若心脾二藏虛極急用參附湯救之

鈎藤是肝經  
風熱藥附子  
是脾腎虛寒  
急宜並行不  
悖乎

一婦人患前證用諸補劑四肢逆冷自汗泄瀉腸鳴腹痛余以陽氣虛寒用六君子加薑附各五錢不應以參附各一兩始應良久不服仍腸鳴腹痛復灸關元穴百餘壯及服十全大補湯方効大全云產後中風口噤者是血氣虛而風入于頰頰夾口之筋也

反張在背屬太陽發督脉二經設果爲風所中能不續命等湯用四物不妨

手三陽之筋結入于頤。症則勞損藏腑傷于筋脉。風若乘之。其三陽之筋脉則偏持之。筋得風冷則急。故令口噤也。

大全云。產後角弓反張者。是體虛受風。風入諸陽之經也。人之陰陽經絡。周環于身。風邪乘虛入于諸陽之經。則腰背反折。攣急如角弓之狀也。

薛氏曰。前證因氣血耗損。腠理不密。汗出多多。而患者虛象也。宜固氣血爲主。佐以本方。丹溪曰。產後當大補氣血爲先。雖有他證。以未治之。如惡寒發熱等症。乃氣血虛甚之極也。宜大劑參耆。歸木肉桂以培養之。如不應。急用炮附子。再不應。用人參一兩。炮附子二三錢。各參附湯。倘行不應。乃藥力未能及也。宜多用之。

小續命湯。治產後中風。身體緩急。或頑痺不仁。或口眼喎斜。牙

大全云。產後中風。口噤者。是血氣虛而風入于頤。頤夾口之筋也。



開緊者已反張

防風

錢

麻黃

去節

黃芩

芍藥

人參

川芎

防已

肉桂

各七

附子

炮

杏仁

未皮

各五分

甘草

炙

四

右剉加生薑水煎溫服

○有熱去附子

減桂一半

○有汗去麻

黃加乾葛

○骨節煩疼

去附子

加芍藥

○精神恍惚

加茯神遠

志○煩心多驚

加犀角

○嘔逆腹脹

加人參

半夏

○骨間疼痛

加附子

官桂

○臟寒下痢

去防風

黃芩

加附子

白木

○煩悶大

便澀

去附子

加芍藥

入竹瀝

○盛冬初春

去黃芩

華陀愈風散

治產後中風口噤

牙關緊閉

手足痲痺如角弓狀

亦治產後血暈不省人事

四肢強直或心眼倒掣吐瀉欲死

此

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

藥清神氣通血脈其効如神

荆芥穗。散不傷氣。行血分。風邪。以豆酒或童便祛風降火。妙不可言。誠產後血暈神方也。

荆芥穗。情迷方加當歸等分。

有為末。每服三錢。溫酒調服。或童子小便亦可。口噤者。搗開灌之。或吹鼻中皆効。李時珍曰。此方諸書盛稱其妙。姚僧坦集驗方以酒服。名如聖散。藥下可立効。陳氏方名舉卿古拜散。肅存敬方。用古老錢煎湯服。名一捻金。許叔微本事方云。此藥委有奇効神聖之功。一婦人產後睡久。及醒則昏昏如醉。不省人事。醫用此藥。及交加散。云服後當睡。必以左手搔頭。用之果然皆効。產寶方云。此病多因怒氣傷肝。或受氣內鬱。或坐草受風而成。宜服此藥也。戴氏證治要訣。名獨行散。買似道悅生隨抄。呼為再生丹。

血風湯。治產後諸風。或痰弱無力。



秦艽

羌活

防風

白芷

川芎

芍藥

當歸

熟地

白朮

茯苓

各等分

右爲細末。每服三錢。溫酒調服。生煉蜜丸。如桐子大。每服五

七十九。溫酒下。

防風湯。治產後中風。背項強急。胸滿氣短。

防風

獨活

各去蘆

葛根

各五兩

當歸

人參

白芍

甘草

炙各二兩

右咬咀。每服八錢。水一盞半。棗二枚。煎一盞。溫服。

雲岐方。中風後中風。半身手足不遂。言語蹇澀。恍惚多忘。精神

不定。

獨活

當歸

芍藥

防風

川芎

右咬咀。以水八升。煮取二升半。分爲三服。覺效更作一劑。又作

玄參

天麻錢各五 桂心錢三

右咬咀以水八升煮取二升半分爲三服覺効更作一劑又作

丸每服二十丸○如有熱加葛根五錢○有冷加白朮五錢○

有氣詔加生薑一兩半○手足不遂加牛膝一錢半草薺三錢○

黃耆四錢○腹痛加芍藥當歸各七錢半○不食加人參五錢○

玄參一兩○若寒中三陰所患必久○小續命湯加薑煎○若暑

中三陽所患必熱○小續命湯去附子減桂一半加薄荷煎○

防風羊角湯治產後氣血不足風邪所襲肢體攣痛背項強直○

防風兩

赤芍炒

桂心各半

羚羊角

川芎

羌活

當歸

酸棗仁炒

牛蒡子炒各

二錢

右剉每服四錢水煎服○

此治心肝二  
經風藥也而  
於下桂心寒  
熱不同乃古



人獨撫其長  
用之達之存

乎其人

如繩束者拘

急收剔之象

靈脂硫黃須  
製用生地汁  
尤妙

川芎散 治產後中風身背拘急有如繩束

川芎

羌活

羚羊角片

酸棗仁

芍藥

炒黃各四兩

桑白皮

一兩

防風

去蘆二錢

右劉每服一兩水煎日進三服

濟危上丹

治產後去血過多氣無所主以致唇白肉冷汗出目

瞋神昏命在須臾此虛極生風也急服此藥若以風藥治之則

誤矣

乳香

五靈脂

硫黃

玄精石

以上各另研極細

阿膠

蛤粉炒

卷柏

桑寄生

陳皮

去白等分

右將前四味同研勻入石臼內微火炒再研極細後入餘藥末

用生地黃汁丸如桐子大每服五十丸忌前溫酒或當歸湯下

此方以獨活一味而治風則妙矣主治風則求也五緩六急皆陰緩而陽急也皆風寒所為故服法如此

雞糞大肝治風濁之血豆

大豆紫湯。治產後風虛五緩六急手足頑麻氣血不調等證。

獨活去皮兩半 大豆半升 酒三升

右先用酒浸獨活煎二三沸別炒大豆令極熱焦烟出以酒沃之去渣每服一二合得少汗則愈日夜數服一以去風一以消血結如妊婦折傷胎死在腹中服此即產○一方無獨活只用大豆炒焦淋酒服

獨活酒。治產後中風。

獨活一斤 桂心三兩 秦艽五兩

右三味咬咀以酒一斗半漬三日飲五合稍加至一升不能多飲隨性服

雞矢酒。治產後中風及百病並男子中一切風神効。



酒去風通身之氣益肝主筋風主氣行血流筋藥肝風散故治一切百病

交加妙法絕然絕神

烏雞養一升炒黃大豆一升炒令虛絕勿焦

右二味以清酒三升乘熱先淋雞養次淋大豆取汁每服一升溫服取汗病重者凡四五服無不愈

交加散治產先後百病兼治婦人榮衛不通經脈不調腹中撮痛氣多血少結聚為癥產後中風並宜服之

生地黄一升研取自然汁生薑十二兩研取自然汁

右將地黃汁炒生薑碎生薑汁炒地黃碎各稍乾焙為細末每服三錢溫酒調下尋常腹痛亦宜服產後尤不可離

一物獨活湯治產後中風虛人不可服他藥者此藥及一物白鮮湯主之亦可與獨活合煮服

川獨活三兩細切以水三升煮取一升分服飲酒者亦可酒

產後中風諸虛四肢拘急

水煮。○白鮮皮亦依獨活法。

羌活散。治產後中風諸證。四肢拘急。

羌活三兩爲末。每服五錢。水酒各半。盞煎服。

右產後中風。用續命湯。及羌活發散之藥。必註氣血。以四物四君子。相與各半。諄對分兩服之可也。

○發瘧。一作瘧。

郭稽中曰。產後汗出多而發瘧者。因產後血虛。腠理不密。故多汗出。遇風邪搏之。則發瘧也。口噤不開。舌強而直。如發癰瘡者。狀如頭馬鳴。身反折。須臾又發。氣息如絕。宜速斅口。灌小續命湯。稍緩。卽汗出如雨。手摸空者。不可治也。

薛氏曰。產後發瘧。因去血過多。元氣虧極。或外邪相搏。以致牙關。



緊急四肢瘳強。或腰背反張。肢體抽搐。若有汗而不惡寒者。曰柔瘳。無汗而惡寒者。曰剛瘳。由亡血過多。筋無所養而致。故傷寒汗下過多。潰瘍膿血大泄。多患之。乃敗證也。急以十全大補湯。大補血氣。如不應。急以附子。或保無虞。若攻風邪。死無疑矣。

夷堅志云。杜王治郝質子婦。產四日。瘳瘳戴眼。背反張。王以爲瘳病。與大豆紫湯。獨活湯而愈。政和間。余妻方分娩。猶在蓐中。忽作此證。頭足反接。相去幾二尺。家人驚駭。以數婢強拘之。不直。適記所云。而藥草有獨活。乃急爲之。召醫未至。連進三劑。遂能直。醫至。卽愈矣。更不須用大豆紫湯。古人處方。神驗屢矣。

陳臨川曰。凡產後口噤。腰背強直。角方反張。皆名曰瘳。又名曰瘳。古人家有什無什。以分剛柔。陰陽而治。今產寶諸書。有申風口噤。

一門。又有角弓反張一門。其實一也。如增寒發熱有類傷寒。皆不  
論及。豈可只以一二藥治之。

按素問有瘧字。而無瘧字。仲景太陽經有瘧病。而無瘧方。則今  
書中瘧字。乃瘧字傳寫之誤也。夫勁瘧二字。諧體諧聲。而瘧之  
病狀。有項背勁急反張之相。則從瘧字無疑。若瘧字于義莫解。  
故當以瘧字爲正。且寒主收引。風寒在太陽經。而項背強直者。  
太陽筋病也。諸方皆主續命。從仲景論矣。郭氏不問。產後虛實。  
邪之有無。而槩宗之。似乎一偏。至薛氏又爲產後亡血過多。非  
急用十個大補。不可若攻風邪。死無疑矣。又一見也。及夷堅志  
案。以大豆紫湯。獨活湯而愈者。則又主于風矣。是續命亦不爲  
妄。但本方有麻黃附子。于氣血兩虛之人。不可輕用。而郭氏論



又有速瀉之說。稍緩卽汗出如雨。反不以麻黃爲忌。何其語之切也。二說均不可廢。臨證之際。詳之可也。

小續命湯。治產後汗多變瘧。口噤首強。或搖頭馬嘶。不時舉發。氣息如絕。

### 方見前中風

陳臨川云。陳無擇評曰。產後汗出多變瘧。亦令服小續命湯。此又難信。旣汗多。如何更服麻黃。官桂。防已。黃芩。葶不若大豆紫湯爲佳。局方大聖散亦夏藥也。愚觀朱奉議云。凡剛柔三瘧。小續命湯並可加減與之。若柔瘧自汗者。去麻黃。加葛根之說。朱奉議必有所據。雖大豆紫湯大聖散良。亦不可偏見。曲說有妨古人之意。

瘧症皆強。口噤。直視。煩熱。脈緊大者。不治。

古人之意

大豆紫湯。治中風頭眩惡風自汗吐冷水及產後百病或中風癱瘓背強口噤直視煩熱脈緊大者不治。

方見前中風。

大豆湯。治產後卒中風發瘧倒悶不知人及妊娠挾風兼治在

毒諸疾。

大豆五升炒令微焦

葛根

獨活名

防己六兩

防己行十二經虛者忌用今分兩且獨宜斟酌

右咬咀每服五錢酒二盞煎至一盞半去渣溫服不拘時日三服。

一方治產後中風諸體疼痛自汗出者及餘百疾。

獨活八兩

當歸四兩

右咬咀以酒八升煮取四升去滓分四服日三夜一取微汗。



敗醬近無識者不知當以何物代之

地黃酒妙甚

若中氣者加桂心二兩不槌更作

羚羊角飲子。治產後氣實腹中堅硬兩脇脹滿心中煩熱渴欲

飲水欲成剛症中風之疾

羚羊角半兩

防風

羌活

桔梗並去敗醬各八錢

桂心

柴胡

大黃

酒浸過煨各一兩一錢

右咬咀每服五錢水一大盞半同煎至一盞去渣溫服不拘時更服地黃酒用地黃切一升炒令黑甕瓶中下熱酒三升密封口煮令減半任意服之

防風當歸散

防風

川芎

當歸

地黃

各五錢

若到每服一兩水三盞煎至二盞溫服

費氏曰續命湯大豆紫湯舉卿古拜散太陽厥陰藥也邪實脈

防風當歸散治之為妙

薛氏曰：續命湯、大正紫湯、風痺、古拜、不陽厥陰、陰氣也。邪實脈

浮弦有力者，固宜。但產後血氣大虛之人，不宜輕發其表。但以  
防風當歸散治之為妙。

### ○瘕瘕

瘕瘕者，抽搐  
伸縮也。

丹皮鈎藤為  
肝火而用。

所謂虛象者，  
土虛反見風  
木之化也。

薛氏曰：瘕者，筋脈拘急也。瘕者，筋脈張縱也。經云：肝主筋而藏血，  
蓋肝氣為陽為火，肝血為陰為水。前證因產後陰血去多，陽火熾  
盛，筋無所養而然耳。故瘕疽膿水過多，金瘡出血過甚，則陽隨陰  
散，亦多致此。治法當用八珍，加丹皮鈎藤以生陰血，則陽火自退。  
諸證白愈。如不應，當用四君芎歸丹皮鈎藤以補脾土，蓋血生于  
至陰。至陰者，脾土也。故小兒吐瀉之後，脾胃虛損，亦多患之。乃虛  
象也。無風可逐，無痰可消。若屬陽氣脫陷者，用補中益氣加薑桂。  
陽氣虛敗者，用十全大補加桂附。亦有復生者。此等證候，若肢體



新  
真假虛寒之

惡寒脈微細者此為真狀若脈浮大發熱煩渴此為假象惟當固本為善若無力抽搐戴眼反折汗出如珠流者皆不治

一產婦因勞兩臂不能屈服蘇合香丸肢體痿軟汗出如水余謂前藥辛香耗散此氣腠理虛而津液妄泄也先用十全大補湯加五味子補實腠理收斂直氣汗頓止又佐以四君子調補元氣漸愈用逍遙散大補湯調理而痊

一產婦先胸脇乳內脹痛後因怒口噤吐痰臂不能伸小便自遺左三部脈弦余謂此肝經血虛而風火所致不能養經先用加味逍遙散治之臂能屈伸又以補肝散六味丸諸證悉愈

一婦人發瘵遺尿自汗面赤或時面青飲食如故肝脈弦緊余曰此肝經血燥風熱名瘵也肝主小便其色青人肝則赤法當滋陰

二婦人產後血風患此以小續命湯數服而安

此肝經血燥風熱名藥也。肝主小便其色青。肝則赤。法當以酸法。

前止言虛而  
死補此又因  
風而治風其  
見圓通之妙

血清肝火。遂用加味逍遙散。不數劑。諸證悉退而安。

一婦人產後。血風患此。以小續命湯。數服而安。

產後因虛。傷風。癰。同。傷寒表證未傳入裏。宜服防風湯。

防風湯。治風虛發熱。項背拘急。肢體不隨。恍惚狂言。來去無時。

不自覺悟。亦治腳氣緩弱甚効。此藥溫和不虛人。

秦艽 獨活 麻黃上 半夏湯洗七次 防風去芦各一兩 升麻

防己 白朮 石膏煨 白芍 黃芩 當歸去 遠志去

人參去 甘草各一兩

右為盃末。每服四錢。水二盅。薑生薑七八分。煎至一盞。去滓。取

清汁六分。入麝香末少許。食後臨臥帶熱服。

華陀愈風散 方見前中風



此即愈風湯當歸散。治產後中風牙關緊急。不省人事。口吐涎沫。手足痲痺。

當歸去 荆芥穗各等分

右為細末。每服二錢。水一盞。酒半盞。煎至半盞。灌之。如牙關緊急。暫開微微灌之。但下咽即生。屢用救人。大有神效。

增損柴胡湯。治產後感冒證。手足痲痺。涎潮昏悶。

柴胡三錢 黃芩一錢二分 人參 甘草炙 半夏各一錢

黃芪一錢 石膏二錢 知母一錢

右取咀分二服。水二盞。生薑三片。棗二枚。煎八分。不拘時服。

秦艽湯。前證已去。次服此藥。去其風邪。

秦艽 芍藥 柴胡各一錢七分 防風 黃芩各一錢二分

人參 半夏各二錢 甘草炙一錢三分

此以小柴胡合白虎加黃芪治虛熱。飲麥怪諸症。乃陽明少陽藥也。內无血藥亦有見。此方蒙肝去風是前服。此藥熱藥。

石吹咀作二帖每帖加生薑三片未煎食遠服

○拘攣

大全云產後中風筋脈四肢攣急者是氣血不足臟腑俱虛月內未滿起早勞役動傷臟腑虛損未復爲風所乘風邪冷氣初客于皮膚經絡則令人頸痺不仁羸乏少氣風氣入于筋脈挾寒則攣急也

薛氏曰肝屬木而主筋前證若肝經風熱血燥用加味道遙散如不應當用六味地黃丸以補腎水經云風客淫氣精乃亡邪傷肝也仍參前雜證諸風血方論治之

一產婦筋攣臂軟肌肉掣動此氣血俱虛而自熱也用十全大補湯而安



產婦手麻服愈風丹。遍身皆麻。神思倦怠。余謂氣血虛弱。用十全大補加炮薑數劑漸愈。去薑又數劑。及逍遙散而痊。

舒筋湯。治一切筋骨拘攣疼痛。益因風濕所傷。氣血凝滯。經絡不行所致。其效如神。

羌活

片子薑黃

甘草

炙各二錢

海桐皮

去外皮

當歸

赤芍

白朮

各一錢

右切作一服。加生薑三片。水煎去滓。磨沈香水少許。入內溫服。

止痛食後。腰以下痛食前。

普濟散

治產後中風。四肢筋脈疼痛。攣急。皆頃強急。

芍藥

羌活

當歸

酸棗仁

炒

羚羊角屑

各七錢半

防風

牛旁子

炒各

桂心

薔薇

各半兩

此即防風。於子角湯。道分兩少異。而牛旁獨多。名以且能去皮。虛。

此氏曰。則方如不應。當用八珍湯。更不應。用十全大補湯。

風通十二經  
利腰肋也

觀薛氏所言  
亦係治風  
議補要得其  
數

本論所重在  
敗血而七珍  
散不用破血  
之味為其本  
于虛

防風 牛旁千 桂心

右咬咀。每服八錢。水煎溫服。不拘時。

薛氏曰。前方如不應。當用八珍湯。更不應。用十全大補湯。

防已膏

治產後中風。四肢筋脈攣急。身體麻木。

漢防已

去皮 生斤 茵芋 五兩

右咬咀。用酒五升。浸藥一宿。取猪肪脂一斤。文武火熬三上三下成膏。攤在紙花上。貼病人患處。以熟羊不佳。麝膏上千遍。

○不語

大全云。人心有七孔三毛。產後虛弱多。致停積敗血。閉于心竅。神志不能明了。又心氣通于舌。心氣閉塞。則舌亦強矣。故令不語。但服七珍散。

薛氏曰。經云。太陽之脈散舌下。又云。脾之脈是動則病。舌本濕不



能言又云腎之別脈上人于心繫舌本虛則不能言竊謂前證若  
心腎氣虛用七珍散腎虛風熱地黃飲大腸風熱加味逍遙散加  
防風白芷脾經風熱秦艽升麻湯肝經風熱柴胡清肝散加防風  
白芷脾氣鬱結加味歸脾湯加升麻肝木太過小柴胡加鈎藤鈎  
脾受土侮六君加升麻白芷鈎藤鈎肝脾血虛用佛手散脾氣虛  
用四君子氣血俱虛八珍湯如不應用獨參湯更不應急加附子  
補其氣而生其血若竟用血藥則誤矣

一產婦不語用七珍散而愈後復不語內熱脯熱肢體倦怠飲食  
不進用加味歸脾湯為主佐以七珍散而愈後因怒不語口噤腰  
背反張手足發搐或小便見血面赤或青或黃或時兼赤余曰面

青肝之本色也黃者脾氣虛也赤者心血虛也用八珍湯加鈎藤

凡新產怒不可有

不語由干昌  
濕謂生痰也  
而謂湯藥過  
多何歟五積  
散之用又與  
解

一鈞茯苓遠志漸愈又用加味歸脾湯而痊

李氏曰有臨產服湯藥過多胃濕使然者熟料五積散六君子湯  
○痰熱迷心不語者導痰湯或痰氣鬱滯閉口不語者用孤鳳散  
七珍散治產後虛弱多致停積敗血閉于心竅神志不明又心  
氣通于舌心氣閉塞則舌亦強故令不語

人參 石菖蒲 生地黃 川芎名一 細辛錢一

防風 辰砂另研各五錢

右爲細末每服一錢薄荷煎湯調服

胡氏孤鳳散治產後閉目不語

生白礬爲末每服一錢熱水調下

一方治產後不語



人參

石蓮肉不去心

石菖蒲各等分

右判每服五錢水煎服。

逐血補心湯。產後失音不語者。心肺二竅為血所侵。又感傷風故也。

當歸一錢半 赤芍藥 生地黃 桔梗 蘇葉 前胡

茯苓 防風 牛胆南星 黃連 粉葛 紅花各錢

人參 升麻各七分 半夏一錢一分 甘草五分

右判加生薑三片水煎空心服。

○狂言譫語。

大全云。產後語言顛倒。或狂言譫語。如見鬼神者。其源不一。須仔細辯證。用藥治療。產後驚風。語言亂道。如見鬼神。精神不定者。研

好藥。妙。諸。下。龍。丹。二。七。位。一。而。狂。言。獨。語。者。當。在。作。見。

好殊砂調酒下龍虎丹

方見局方

三九作一服。琥珀地黃丸服之。

好殊砂調酒下。龍虎丹。方見局方三丸作一服。兼琥珀地黃丸服之。○  
一則曰產後心虛敗血停積上干於心而狂言獨語者當在乍見  
鬼神條求之。○二則產後臆虛心神驚悸志意不安言語錯亂不  
自覺知神思不安者當在驚悸條求之。○三則宿有風毒因產心  
虛氣弱腰背強直或歌哭噴笑言語亂道當作風症治療當在心  
驚中風條求之。○四則產後心虛中風心神恍惚言語錯亂當在  
中風恍惚條求之。○五則產後多因敗血迷亂心經而顛狂言錯  
錯亂無常或暈悶者當于本卷血暈類求之。○六則因產後感冒  
風寒惡露斷然不行憎寒發熱如瘧晝日明了暮則譫語如見鬼  
狀當作熱入血室治之宜琥珀地黃丸及四物湯只用生乾地黃  
加北柴胡等分煎服如不退者以小柴胡湯加生乾地黃如黃芩

即傷寒治法



分兩煎服。愈。雖然以上諸症。大抵胎前產後。自有專門一定之法。毫髮不同。如產後首當逐敗生新。然後仔細詳辨。疾證不可妄立。名色。自生新意。加減方藥。大宜對證。依古法施治。未有不安者也。薛氏曰。前證當固胃氣為主。而佐以見證之藥。若一味攻痰。則誤矣。

一產婦。形體甚倦。時發譫語。用栝子散稍愈。又用加味歸脾湯而愈。又因怒。仍狂言脇痛。小便下血。用加味逍遙散。以清肝火。養肝血。頓疾。又佐以加味歸脾湯而安。

一靈三聖散。治產後敗血冲心。發熱狂言。奔走脈虛大者。

乾荷葉

生乾地黄

牡丹皮

生蒲黃

另研各二錢

前三味濃煎湯。調入蒲黃末。一服即定。

前二脈虛弱，服此藥，人謂其未一服即定。

奪命湯。產後血入心經。語言顛狂。健忘失志。

方見前血暈。

調經散。治氣血虛損。陰虛發熱。或瘀血停滯。以致心神煩躁。如

見鬼神。或言語譫妄。

沒藥。琥珀并細桂心各一錢。赤芍藥炒。當歸酒浸各一錢。

細辛二錢。麝香少許。

右為細末。每服半錢。生薑汁溫酒各少許調服。或用蘇合香

丸一錢。以童便調服即醒。

柏子仁散。治產後元氣虛弱。瘀血停滯。狂言亂語。如見鬼神。

柏子仁。遠志。生地黄焙。人參。當歸。

桑寄生。防風。琥珀另研。甘草炙各等分。

桑寄生治產後餘疾。益血脈。

產後用蘇合香。忠芳香太過。走散真氣。以童便調服。具見妙用。

此方重在療。以停滯不治。陰虛發熱。故用桂心射香。



右為麓末。先用白羊心一個切片。以水三盞。煮取清汁七分。人

藥末五錢。煎至六分服。

妙香散。治產後心神顛倒。語言錯亂。如見鬼神。

乾山藥 白茯苓 茯神去木 黃芪 遠志去心各一兩 人參

甘草 桔梗各五錢 辰砂三錢 木香二錢五分 麝香一錢

右為末。每服二錢。溫酒調服。○一方用生乾地黃當歸二味煎

湯調服立效。

烏金散。治產後三五日。或半月之間。忽狂言亂語。目見鬼神等

證。

當歸 川芎 赤芍藥 熟地黃 白朮 遠志肉

茯神去木 羌活 酸棗仁 辰砂另研 防風 香附子各二錢

經曰。心者君  
主之官。神明  
出焉。故神非  
心。有而天與  
之有也。大與  
之者。神也。九  
明之氣。也。上  
故心室。治而  
神。舍之。大與  
神。神。神。神。

無所不有  
所發見之病  
矣故心室不  
可一日不精  
而神明不居  
也  
大生神者氣  
養心者血也  
氣血盛則神  
明氣血虛則  
神明衰而思  
慮少如產后  
三五半月之  
間其氣血誠  
虛矣或成空  
有所驚則神  
出舍而邪以  
其室遂使神  
所主而狂亂  
生矣所謂邪  
者風痰也取  
血也本方以  
羌活芷蝎天  
麻半夏以去  
風痰四因回  
物以清氣血  
與風痰則以

半夏錢三 白芷 陳皮各一錢五分 人參 麥門冬三各 牛膝

天麻 全蝎各一錢九分 甘草

右劉作二服薑三片葱三条入金銀同煎服。

四物補心湯。治產後言語恍惚顛倒錯亂。

當歸錢五 川芎 白芍藥 生地黄 白朮

半夏 桔梗 茯神各四錢 陳皮三錢 甘草一錢

右劉為散。分作六服。每用薑三片水煎空心服。有熱加酒炒。

黃連二錢。無熱不用。

寧神膏。治失血過多。心神昏悶。言語失常。不得睡卧。

辰砂 乳香 酸棗仁炒 人參 茯苓各一兩 琥珀七錢半

右為末。每服一錢。燈心棗仁煎湯調服。或蜜丸彈子大。薄荷煎。



牛膝赤芍行  
之氣有以滯  
則以香附同  
皮理之神不  
歸則格之以  
茯苓杏仁志  
不宜則遠志  
以辰砂遠志  
而麥門冬藥  
為清心夢藥  
金銀者為安  
鍾之丹則內  
以蒸美則內  
通神明制方  
者其神全者  
與

湯化下一丸。

琥珀地黄丸。治心血虛而言語譫妄。

琥珀

研另

玄胡索

糯米炒赤去米

當歸各一

蒲黃炒匹兩

生地黄

生薑各二斤

右地黄生薑各另搗汁。留澄以生薑汁炒地黄渣。地黄汁炒生

薑渣。各乾與前四味俱為末。煉蜜丸如彈子大。每服一九當歸

湯煎下。

○顛狂

大全云。療產後因驚敗血沖心。昏悶發狂。如有鬼祟。宜用局方大

聖澤蘭散。加好辰砂研令極細。每服加一字許。煎酸棗仁湯調下。

一服可安。

一服可安。

薛氏曰。前證乃血虛神不守舍。非補養元氣不可。仍於後各門五用。

一產後患前證。或用大澤蘭湯而愈後。又怔忡妄言。其痰甚多。用茯苓散補其心虛。頓愈。又用八珍散加遠志茯苓。養其氣血而瘳。一產婦亦患此證。用化痰安神等藥。病益甚。神思消鑠。余以爲心脾而氣不足。用大劑參朮。芩歸。茯神。酸棗。三四斤餘而安。乃以歸脾湯五十餘劑而愈。

大聖澤蘭散。治婦人血滯虛冷。久無子息。及產後敗血冲心中。風口噤。子死腹中。劈開口灌藥。須臾生下。便得無恙。陷墮胎腹中。攻刺疼痛。橫生逆產。胎衣不下。血暈血癖。血滯血崩。血入四肢。一應血藏有患。及諸證風氣。或傷寒吐逆咳嗽。寒熱往來。遍



身生瘡。頭痛惡心。經脈不調。赤白帶下。乳生惡氣。胎藏虛冷。數  
墮胎。崩中不定。因此成疾。室女經脈不通。並宜服之。常服煖  
子宮。和血氣。悅顏色。退風冷。消除萬病。兼療丈夫五勞七傷。虛  
損等病。

澤蘭葉

石膏

研各二兩生地黄

當歸

川芎

芍藥

蘇夷

甘草

炙各一兩七錢半

肉桂

一兩二錢半

厚朴

姜汁炒

白茯苓

防風

細辛

吳茱萸

湯洗七次

梔子

栝子仁

微炒

桔梗

各二兩

黃草

人參

白朮

丹參

五味子

川椒

去目并閉口者微炒

川烏頭

炮去皮

乾薑

炮

藥木

去

白芷

各七錢半

白薇

阿膠

碎炒燥

合半兩

右為細末

每服二錢

空心

臨臥

熱酒調下

若急疾不拘時日三

抱膽丸  
治產後過驚發狂或遇經行發狂

水銀二兩  
黑鉛二兩  
硃砂二兩  
乳香二兩

右將黑鉛八銖內火鎔開下水銀攪結成砂子下硃砂乳香乘熱用椰子槌研勻丸如雞頭實大每服一丸空心薄荷湯下得睡勿驚覺覺來即安○妙香散亦善

辰砂遠志并。治產後中風驚狂起臥不安或痰涎上湧。

石耳蒲 遠志志 人參 扶朮去水 辰砂各三錢

川芎  
山藥  
鐵粉  
細辛  
麥門冬去心

大麻  
半夏湯  
南星  
白附子  
各兩

右爲末。薑汁煮糊丸。如菜豆大。外以硃砂爲衣。每服三十丸。臨

人之神以心  
爲宅水銀之  
液以砂爲居  
心以水銀之  
砂迫乎神神  
以砂應五方  
則以圓通不  
切不長或以  
類從爲然心  
火之下陰精  
承之則安水  
銀之液黑如  
調之則定所  
以者皆以真  
水相真火也  
木方以乳香  
通心氣隔砂  
養心而益夫  
交心腎子頃  
刻而引神歸  
舍也神歸則  
厓安矣



臥薑湯下

加味八珍湯。產後顛狂乃血虛神不守舍。非補養元氣不可用。

此或茯苓散歸脾湯。

下二方見后  
驚悸門

人參 白朮 茯苓 甘草 當歸 川芎

芍藥 熟地黃 遠志 茯神各二

右剉加姜棗水煎服。

○仁見鬼神。與前顛狂譫語門參看。

大全云。心主身之血脈。因驚傷以耗血脈。致心氣虛。其敗血停積。上干于心。心不受觸。遂致心中煩躁。臥起不安。仁見鬼神。言語顛錯。醫人不識。呼為風邪。如此為治。必不得愈。但服調經散。每服加

一匙。加龍腦。

龍腦一匙得睡即安。

龍腦一合得睡則安

前論云言痰  
血而不言痰  
此言痰而又  
不始痰但調  
胃氣設果有  
痰亦須觀入  
頭怯為之  
脈虛者亦可  
加柴胡但症  
則可

薛氏曰前證若敗血停滯用調經散若血虛發熱用八珍加炮姜  
若心血虛損用聖仁散大抵此證皆心脾血少之所致但調補胃  
氣則痰清而神自安矣若果係鬼祟所附即灸鬼穴可愈其或不  
起多因豁痰降火伐之過也

一產婦患前證或用調經散愈而復作仍服前藥益甚痰涎上湧

朝寒暮熱余朝用八珍湯久用加味歸脾湯各五十餘劑而愈

雲岐治產後發熱証言奔走脈虛大者四物湯加柴胡如不愈加

甘草柴胡生地黃等分煎服亦可

調經散方見前狂言諸語

琥珀散治產後瘀血攻心迷悶妄言見鬼

人參 茯神 生地黄 阿膠各七錢 硃砂五錢 另研

承合調月 卷十二頭狂 三



甘草 琥珀 鐵粉另研各一錢 麝香另研各一錢

右為細末。每服三錢。用金銀煎湯調下。

茯神散。治產後血邪。心神恍惚。言語失度。坐臥不安。

茯神去木一錢 人參 黃芪 赤芍藥 牛膝

琥珀研 龍齒研各七錢半 生地黄一兩半 桂心兩

右為末。每服三錢。水煎服。

一方。治產後血暈。心迷狂亂。恍惚如見鬼。

生益母草三合根亦可 生地黄汁二合 童便合 雞子清三枚

右同煎三四沸。後入雞子清攪勻。作一服。

驚悸

太全云。產後臟虛。心神驚悸。皆由體虛。心氣不足。心之經為風邪。

凡逐瘀之藥。必香。然造方不若。香不燥。熱為清。火逐瘀聖藥。益血時宜。也。不虛者忌用。

大全二云。驚悸者。由體虛心氣不足。心之經。為風所

所乘也。或恐懼憂怕。令心氣受于風利。和搏于心。則驚。驚不自安。若驚不已。則悸動不足。其狀目睛不轉。而不能動。診其脈動而弱者。驚悸也。動則為驚。弱則為悸矣。

薛氏曰。按人之所主者。心心之所主者。血。心血一虛。神氣不守。此驚悸所由作也。當補氣血為主。

一產婦患前證。二度服琥珀地黃丸。局方妙香散。隨效。再患服之。其證益甚。而脈浮大。按之如無。然熱惡寒。此血氣俱虛。用十全大補加味歸脾二湯。各百餘劑。而愈。後遇驚悸。勞怒復作。仍服前藥。加味四物湯。治產後血少怔忡無時。

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 茯神  
酒洗 去木各一錢

遠志 酸棗仁  
去心 炒各七分



右咬咀水煎服。

白茯苓散。治產後心神驚悸。言語失常。

白茯苓 人參 熟地黄各一兩半 黃芪 當歸

白芍藥 遠志去心 麥門冬去心 桂心 甘草炙各一兩

石葛精 桑寄生各七錢半

右咬咀。每服八錢。水一大盞。半生薑五片。鹽三枚。竹葉三七片。

煎至一大盞。去滓。溫服。無時。

熟乾地黄散。治產後心神驚悸。神思不安。

熟乾地黄二兩 黃芪 白薇 龍齒另研各一兩

茯神去木 人參 羌活 遠志剉各七錢

桂心 防風 甘草炙各半兩

熟氣而藥爲主。似突而以羌活爲佐。者。豈非有風邪。

右咬咀。每服五錢。水一大盞。半生薑五片。鹽三枚。煎至一大盞。去滓。溫服。無時。

煎之耶

凡產後方

人喜用熱藥

今人仍古方

者亦十之九

此方以芎歸

姜桂為主似

本熱炭為之

溫血行血則

可謂其能

調和血氣友

神鎮驚則未

可也惡者

悉再詳之

右咬咀每服五錢水一大盞半生薑五片棗三枚煎至一大盞去滓溫服不拘時○一方無黃芪有荆芥

產乳七寶散初產後服之調和血氣補虛安心神鎮驚悸

當歸

川芎

人參

白茯苓

桂心

羚羊角

燒存性

硃砂

水飛各二錢

乾薑

一錢

右為細末每服一錢用羌活豆淋酒調下不飲酒用清米飲調

下○如覺心煩熱悶以麥門冬去心煎湯調下○若心下煩悶

而痛用童便調下○若覺心胸煩熱即痛薑桂心寒却加之○

腹痛加當歸○心悶加羚羊角○心虛氣怯加桂心○不思飲

食或惡心如人參○虛煩加茯苓○以意斟酌旦二夜一服之

人參散治產後臍腹虛心怔驚悸言語錯亂



此方活涼氣  
血並補而治  
察不用燥劑  
清心不入苦  
寒可補辛熱  
之未備而獨  
活防風又治  
風升舉之法  
須察之

妙在用銀二  
斤

人參

麥門冬

去心各八錢

茯神

遠志

去心獨活

防風

生地黃

甘草

炙天竺黃

另研龍齒

朱砂

小飛各四錢

牛黃

白薇

各一錢龍腦

另研麝香

一錢

右為細末每服二錢薄荷酒調下不拘時

琥珀散

治血虛驚悸少寐及產後敗血停留少腹作痛

辰砂

另研

沒藥

琥珀

並研細

當歸

等分

右為細末每服二錢空心日午臨臥白湯調下

茯苓散

治產後狂語志意不定精神昏亂心氣虛風邪所致

茯苓

一方用茯神

生地黃

各三兩

遠志

白薇

龍齒

各二兩五錢

人參

防風

獨活

右為末以銀二斤水一斗五升煮取七升下諸藥煮取三升溫

治產後血虛氣弱甚大汗利皆至于死此重虛故也若中

右為未以銀一斤水一斗五升煮取七升下諸藥煮取三升

既不宜大汗  
何必用羌活  
三兩所未信  
也下竹瀝一  
升炒甚

分三服。昆崧菜猪肉生冷。一方加荆芥二兩甘草二兩二錢半。治產後多虛羸弱若大汗利皆至于死此重虛故也若中

風語謬昏悶不知人者宜服此

人參 茯苓 羌活 遠志 大棗 各二兩 竹瀝 一升

右用水六升煮取二升下竹瀝更煎二升半分三服

歸脾湯 治產後血氣大虛心神驚悸怔忡不寐或心脾傷痛坐

臥少食或憂思傷脾血虛發熱

人參 黃芪 炒 白朮 炒 白茯苓 龍眼肉

當歸 遠志 去心 酸棗仁 炒各一錢 木香 甘草 各五分

右加薑棗煎服。加柴胡牡丹皮各加味歸脾湯

遠志丸 治產後臟虛不足心神驚悸志意不安腹中急痛或時



怕怖夜卧不寧

遠志

麥門冬去心

黃芪

當歸炒

人參

白朮

獨活去苦

白茯苓

桂心

栝子仁

山茱萸

石菖蒲

熟地黃

鍾乳粉

阿膠碎炒各一兩

右為細末煉蜜和搗五七百下化如桐子大每服三十丸溫酒

送下不拘時日進三服

白茯苓丸 治產後心虛驚悸神志不安

白茯苓

熟地黃各一兩

人參

桂心

遠志去心

石菖蒲

栝子仁

琥珀另研各半兩

右為細末煉蜜和搗三百下丸如桐子大每服三十丸不拘

時粥飯送下

此溫補法于虛寒者宜之然心虛則熱收于內用辛熱藥交當斟酌

恍惚

自不語至恍惚等症有謂氣血虛者謂敗血入心有謂風邪所乘

恍惚不定也。薛氏曰前證當大補血氣為主而佐以後方為善蓋風為虛極之

一皆各為心風然此風從何來當從何治則人亦不

假象也固其本源諸病自退若專治風則速其危矣

之悉但言治然此風而用藥之齊則以

一產婦患前證益汗自汗發熱晡熱而色黃白四肢畏冷此氣血俱虛用八珍湯不應更用十全大補加味歸脾二湯始應後因勞

大補氣血為去有所見在諸症酌用

怒發厥昏愒左目牽緊兩唇抽動小便自遺余謂肝火熾盛用十全大補加鈎藤山梔而安再用十全大補湯辰砂遠志丸而愈

虛而之火飲生如是耳

千金方治產後暴甚心悸不定言語錯亂恍惚皆因心虛所致



此方恒以  
補心之  
治者又與其  
大抵反以傷  
血。尊古法不  
所當因病致  
宜也。  
此原心之劑  
心熱者宜之。

真產後中風  
皆直之。若曰  
虛風所為則  
不宜用風藥  
矣。

茯苓<sup>三兩</sup> 芍藥<sup>二兩</sup> 當歸 桂心 甘草<sup>各一兩</sup>

麥門冬<sup>去心</sup> 生薑<sup>一兩</sup> 大棗<sup>三十枚</sup>

右為散。用水三升。煎取一升。去滓。分作兩服。

經效方。療產後心虛。恍惚。志意不定。煩躁。恍惚。

茯神 當歸 芍藥 人參 麥門冬<sup>去心</sup>

酸棗仁<sup>炒</sup> 黃芩 甘草 白鮮皮<sup>各二兩</sup> 大棗<sup>七枚</sup>

右為麤末。水二升。煮取七合。去滓。溫服。

琥珀散。治產後中風。恍惚。語澁。心神煩悶。四肢不隨。

琥珀<sup>另研</sup> 茯神<sup>去木各一兩</sup> 遠志<sup>去心</sup> 石菖蒲 人參

黃芪 麥門冬<sup>去心</sup> 芎藭 赤芍 防風

獨活 桑寄生 羚羊角屑<sup>各半兩</sup> 甘草<sup>炙二錢半</sup>

右以酒煮。每服五錢。水煎。服。不拘時。



此與前方不遠志散。治產後中風。心神恍惚。言語錯亂。煩悶。睡臥不安。桂心故非真。中風者不敢服。可溪有云。北方之人真。中風者恒有之。用方。皆是熱生熱。熱生風。且如恍惚錯亂。煩悶不安。皆熱也。何敢用焉。

右咬咀。每服五錢。水煎溫服。不拘時。

遠志散。治產後中風。心神恍惚。言語錯亂。煩悶。睡臥不安。

遠志去防風去當歸去茯神去酸棗仁炒

麥門冬去桑寄生去獨活去羚羊角屑去桂心各七錢半

甘草炙半兩

右咬咀。每服五錢。水煎服。

天麻丸。治產後中風。恍惚。語澁。四肢不隨。

天麻去防風去羌活去朱砂水飛各一兩僵蚕炒七錢半

乾竭炒五靈脂炒白附子炮各半兩雄雀糞炒牛黃另研各二錢半

右為細末。糯米飯為丸。如梧子大。每服二三十丸。薄荷酒送下。

日進二服。



辰砂遠志丸

主產後中風消風化痰安神鎮心

辰砂

遠志肉

甘草煮

石菖蒲

人參

茯神

去木各五分

川芎

山藥

麥門冬

去心

細辛

天麻

半夏

南星

白附子

鐵粉

各一兩

右爲末薑汁煮糊丸如漿豆大別以硃砂爲衣每服三十丸夜臥生薑湯下







